

9/5/3

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010990242 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 1996-487191/199649

XRAM Acc No: C96-152646

XRPX Acc No: N96-410515

Oxidn. hair dye compsns. - contg. new or known 4,5-diamino-pyrazole  
derivs.

Patent Assignee: L'OREAL SA (OREA )

Inventor: BURANDE A; HOCQUAUX M; MALLE G; VIDAL L

Number of Countries: 025 Number of Patents: 019

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
EP 740931	A1	19961106	EP 96400950	A	19960503	199649	B
WO 9634591	A1	19961107	WO 96FR675	A	19960503	199650	
FR 2733749	A1	19961108	FR 955422	A	19950505	199701	
EP 740931	B1	19970820				199738	
DE 69600054	E	19970925	DE 600054	A	19960503	199744	
			EP 96400950	A	19960503		
ES 2109111	T3	19980101	EP 96400950	A	19960503	199809	
JP 10506672	W	19980630	JP 96533082	A	19960503	199836	
			WO 96FR675	A	19960503		
BR 9608393	A	19990504	BR 968393	A	19960503	199924	
			WO 96FR675	A	19960503		
JP 2000186226	A	20000704	JP 96533082	A	19960503	200037	
			JP 99371719	A	19960503		
US 6099592	A	20000808	US 96642622	A	19960503	200040	
JP 3128245	B2	20010129	JP 96533082	A	19960503	200113	
			WO 96FR675	A	19960503		

RU 2168326	C2	20010610	WO 96FR675	A	19960503	200143
			RU 97120112	A	19960503	
US 6338741	B1	20020115	US 96642622	A	19960503	200208
			US 2000494762	A	20000131	
US 20020050013	A1	20020502	US 96642622	A	19960503	200234
			US 2000494762	A	20000131	
			US 2001978764	A	20011018	
CN 1189772	A	19980805	CN 96195290	A	19960503	200272
US 20030019051	A9	20030130	US 96642622	A	19960503	200311
			US 2000494762	A	20000131	
			US 2001978764	A	20011018	
JP 3416090	B2	20030616	JP 96533082	A	19960503	200340
			JP 99371719	A	19960503	
US 6645258	B2	20031111	US 96642622	A	19960503	200382
			US 2000494762	A	20000131	
			US 2001978764	A	20011018	
CA 2217333	C	20040106	CA 2217333	A	19960503	200406
			WO 96FR675	A	19960503	

Priority Applications (No Type Date): FR 955422 A 19950505

Cited Patents: EP 216334; EP 375977; FR 2586913; GB 2180215; WO 9408969; WO 9408970; WO 9408971

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

EP 740931	A1	F	32	A61K-007/13	
-----------	----	---	----	-------------	--

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE

WO 9634591	A1	F	60		
------------	----	---	----	--	--

Designated States (National): BR CA CN JP PL RU

FR 2733749	A1		56	C07D-231/38	
------------	----	--	----	-------------	--

EP 740931	B1	F	46		
-----------	----	---	----	--	--

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE

DE 69600054	E				
-------------	---	--	--	--	--

Based on patent EP 740931

ES 2109111	T3				
------------	----	--	--	--	--

Based on patent EP 740931

JP 10506672	W		66	C09B-067/42	
-------------	---	--	----	-------------	--

Based on patent WO 9634591

BR 9608393	A				
------------	---	--	--	--	--

Based on patent WO 9634591

JP 2000186226	A		23	C09B-067/42	
---------------	---	--	----	-------------	--

Div ex application JP 96533082

US 6099592	A			A61K-007/13	
------------	---	--	--	-------------	--

JP 3128245	B2		21	C09B-057/00	
------------	----	--	----	-------------	--

Previous Publ. patent JP 10506672

RU 2168326	C2			A61K-007/13	
------------	----	--	--	-------------	--

Based on patent WO 9634591

US 6338741	B1			A61K-007/13	
------------	----	--	--	-------------	--

Based on patent WO 9634591

Cont of application US 96642622

Cont of patent US 6099592

US 20020050013	A1			A61K-007/13	
----------------	----	--	--	-------------	--

Cont of application US 96642622

Cont of application US 2000494762

Cont of patent US 6099592

CN 1189772	A			A61K-007/13	
------------	---	--	--	-------------	--

US 20030019051	A9			A61K-007/13	
----------------	----	--	--	-------------	--

Cont of application US 96642622

Cont of application US 2000494762

Cont of patent US 6099592

Cont of patent US 6338741

JP 3416090	B2		24	C09B-067/42	
------------	----	--	----	-------------	--

Div ex application JP 96533082

Previous Publ. patent JP 2000186226

US 6645258	B2			A61K-007/13	
------------	----	--	--	-------------	--

Cont of application US 96642622

Cont of application US 2000494762

Cont of patent US 6099592

Oxidn. dye compsns. for dyeing keratinic fibres, esp. human hair, contain 3-substd. 4,5-diamino-pyrazoles of formula (I) or their acid-addn. salts as developers. R1-R5 = H; 1-6C alkyl; 2-4C hydroxyalkyl or aminoalkyl; phenyl opt. substd. by halo, 1-4C alkyl, 1-4C alkoxy, NO2, CF3, NH2 or 1-4C alkylamino; benzyl opt. substd. by halo, 1-4C alkyl, 1-4C alkoxy, methylenedioxy or NH2; or (CH2)mX(CHY)nZ; or R3 can also = NH2 or 1-4C alkylamino when R2 = H; m, n = 1-3; X = O or NH; Y = H or Me; Z = Me, OR or NRR'; R, R' = H, Me or Et; R6 = 1-6C alkyl; 1-4C hydroxyalkyl, 1-4C aminoalkyl; mono- or di(1-4C alkyl)amino(1-4C alkyl); (1-4C hydroxyalkyl)amino(1-4C alkyl); (1-4C alkoxy)methyl; phenyl opt. substd. by halo, 1-4C alkyl, 1-4C alkoxy, NO2, CF3, NH2 or 1-4C alkylamino; benzyl opt. substd. by halo, 1-4C alkyl, 1-4C alkoxy, methylenedioxy or NH2; thienyl, furyl or pyridyl; or (CH2)pO(CH2)qOR''; p, q = 1-3; R'' = H or Me; provided that: (a) at least one of R2-R5 = H; (b) only one of R2 and R3, and only one of R4 and R5, can be opt. substd. phenyl, benzyl or (CH2)mX(CHY)nZ; (c) when R4 = R5 = H, then R1+R2+R3 can form a hexahydropyrimidine or tetrahydroimidazole ring opt. substd. by 1-4C alkyl or 1,2,4-tetrazolyl; and (d) when R2-R5 = H or 1-6C alkyl, then R1 or R6 may also = 2-, 3- or 4-pyridyl, 2- or 3-thienyl or 2- or 3-furyl gp. opt. substd. by Me or a cyclohexyl gp.

Cpds. (I) are new when: (i) R6 is not hydroxymethyl, isobutyloxymethyl, methoxyethoxymethyl, cyclohexyl, thienyl, pyridyl, phenyl, methylphenyl, trifluoromethylphenyl or chlorophenyl when R1 = Me, R2, R4 and R5 = H and R3 = H or Me; (ii) R6 is not Ph when R1 = Ph and R2-R5 = H; (iii) R3 is not H, Me or Ph when R1 = Ph, R2, R4 and R5 = H and R6 = Me; (iv) R3 is not Ph when R1 = Ph, R2 = Me or Et, R4 and R5 = H and R6 = Me; (v) R4 is not Me when R1 = Ph, R2, R3 and R5 = H and R6 = Me; (vi) R1 is not chlorophenyl, trifluoroethyl-phenyl, nitrophenyl or pyridyl when R2-R5 = H and R6 = Me; (vii) R3 is not H, 1-4C alkyl or Ph when R1, R2, R3 and R5 = H and R6 = phenyl opt. substd. by Cl, Me or OMe; (viii) R6 is not Me when R1-R5 = H; (ix) R6 is not Me or Ph when R1 = beta -hydroxyethyl and R2-R5 = H; (x) R6 is not phenyl opt. substd. by Me, Et, OMe or Cl when R4 = Me, R5 = Ph, R2 and R3 = H and R1 = H or Me; (xi) R6 is not Me when R1 = t-Bu and R2-R5 = H; (xii) R6 is not Me or Ph when R1 = pyridyl, R2, R4 and R5 = H and R3 = H or Me; (xiii) R6 is not Me when R1 = Me, Et or 4-aminophenyl, R2, R4 and R5 = H and R3 = H or Ph; (xiv) R3 and/or R6 is not Me when R1 = i-Pr and R2, R4 and R5 = H; and (xv) R6 is not Me or Ph when R1 = H or Ph, R2, R4 and R5 = H and R3 = benzyl, methylphenyl or chlorophenyl.

ADVANTAGE - The compsns. give strong colours in shades ranging from red to blue.

Dwg.0/0

Title Terms: OXIDATION; HAIR; DYE; COMPOSITION; CONTAIN; NEW; DI; AMINO; PYRAZOLE; DERIVATIVE

Derwent Class: D21; E23; Q34

International Patent Class (Main): C07D-231/38; C09B-057/00; C09B-067/42

International Patent Class (Additional): A61K-007/00; A61K-007/13;

B65D-081/32; C07D-231/10; C07D-401/04; C07D-405/02; C07D-409/04;

C07D-487/04; D06P-003/08

File Segment: CPI; EngPI

⑨ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
PARIS

⑪ N° de publication :  
(à n'utiliser que pour les  
commandes de reproduction)

**2 733 749**

⑫ N° d'enregistrement national :

**95 05422**

⑬ Int Cl<sup>e</sup> : C 07 D 231/38, A 61 K 7/13

⑭

**DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

**A1**

⑮ Date de dépôt : 05.05.95.

⑯ Priorité :

⑰ Demandeur(s) : L'OREAL SOCIETE ANONYME —  
FR.

⑱ Inventeur(s) : VIDAL LAURENT, BURANDE AGNES,  
MALLE GERARD et HOCQUAUX MICHEL

⑲ Date de la mise à disposition du public de la  
demande : 08.11.96 Bulletin 96/45.

⑳ Liste des documents cités dans le rapport de  
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du  
présent fascicule.*

㉑ Références à d'autres documents nationaux  
apparentés :

㉒ Titulaire(s) :

㉓ Mandataire : L'OREAL

㉔ COMPOSITIONS POUR LA TEINTURE DES FIBRES KERATINIQUES CONTENANT DES DIAMINO  
PYRAZOLES, PROCEDE DE TEINTURE, NOUVEAUX DIAMINO PYRAZOLES ET LEUR PROCEDE DE  
PREPARATION.

㉕ L'invention a pour objet de nouvelles compositions  
pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques compre-  
nant au moins un dérivé de diaminopyrazole particulier, le  
procédé de teinture mettant en oeuvre cette composition,  
de nouveaux dérivés de diaminopyrazole ainsi que leur  
procédé de préparation.

**FR 2 733 749 - A1**



**COMPOSITION POUR LA TEINTURE DES FIBRES KERATINIQUES CONTENANT  
AU MOINS UN DIAMINOPYRAZOLE, PROCEDE DE TEINTURE, NOUVEAUX  
DIAMINO PYRAZOLES ET LEUR PROCEDE DE PREPARATION**

5

L'invention a pour objet de nouvelles compositions pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques comprenant au moins un 4,5-diamino pyrazole 3-substitué à titre de base d'oxydation, le procédé de teinture mettant en oeuvre cette composition, de nouveaux 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués ainsi que leur procédé de préparation.

10

Il est connu de teindre les fibres kératiniques et en particulier les cheveux humains avec des compositions tinctoriales contenant des précurseurs de colorant d'oxydation, en particulier des ortho ou paraphénylènediamines, des ortho ou paraaminophénols, des composés hétérocycliques tels que des dérivés de  
15 diaminopyrazole, appelés généralement bases d'oxydation. Les précurseurs de colorants d'oxydation, ou bases d'oxydation, sont des composés incolores ou faiblement colorés qui, associés à des produits oxydants, peuvent donner naissance par un processus de condensation oxydative à des composés colorés et colorants.

20 On sait également que l'on peut faire varier les nuances obtenues avec ces bases d'oxydation en les associant à des coupleurs ou modificateurs de coloration, ces derniers étant choisis notamment parmi les métadiamines aromatiques, les métaaminophénols, les métadiphénols et certains composés hétérocycliques.

25 La variété des molécules mises en jeu au niveau des bases d'oxydation et des coupleurs, permet l'obtention d'une riche palette de couleurs.

La coloration dite "permanente" obtenue grâce à ces colorants d'oxydation, doit par ailleurs satisfaire un certain nombre d'exigences. Ainsi, elle doit être sans  
30 inconvénient sur le plan toxicologique, elle doit permettre d'obtenir des nuances dans l'intensité souhaitée et présenter une bonne tenue face aux agents extérieurs (lumière, intempéries, lavage, ondulation permanente, frottements).

Les colorants doivent également permettre de couvrir les cheveux blancs, et être enfin les moins sélectifs possible, c'est à dire permettre d'obtenir des écarts de coloration les plus faibles possible tout au long d'une même fibre kératinique, qui peut être en effet différemment sensibilisée (i.e. abîmée) entre sa pointe et sa

5 racine.

Pour obtenir des nuances rouges, on utilise habituellement, seul ou en mélange avec d'autres bases, et en association avec des coupleurs appropriés, du para-aminophénol, et pour obtenir des nuances bleues, on fait généralement appel à des

10 paraphénylènediamines.

Il a déjà été proposé, notamment dans la demande de brevet EP-A-375 977, d'utiliser certains dérivés de diamino pyrazoles, à savoir plus précisément des 3,4- ou des 4,5-diamino pyrazoles, pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques

15 dans des nuances rouges. Toutefois, l'utilisation des diamino pyrazoles décrits dans cette demande de brevet ne permet pas d'obtenir une riche palette de couleurs et, de plus, le procédé de préparation de ces composés est long et coûteux.

Or, la demanderesse vient maintenant de découvrir, de façon totalement inattendue et surprenante, que l'utilisation de certains 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués de


20 formule (I) définie ci-après, pour partie nouveaux en soi, non seulement convient pour une utilisation comme précurseurs de colorant d'oxydation, mais en outre qu'ils permettent d'obtenir des compositions tinctoriales conduisant à des colorations puissantes, dans des nuances allant du rouge jusqu'au bleu. Enfin, ces composés

25 s'avèrent être aisément synthétisables.

Ces découvertes sont à la base de la présente invention.


L'invention a donc pour premier objet une composition pour la teinture d'oxydation

30 des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins un 4,5-diamino pyrazole 3-substitué de formule (I) ci-dessous à titre de base d'oxydation et/ou au moins un de ses sels d'addition avec un acide :



dans laquelle :

- $R_1, R_2, R_3, R_4$  et  $R_5$ , identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ;
- 5 un radical alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié ; un radical hydroxyalkyle en  $C_2-C_4$  ; un radical aminoalkyle en  $C_2-C_4$  ; un radical phényle ; un radical phényle substitué par un atome d'halogène ou un radical alkyle en  $C_1-C_4$ , alcoxy en  $C_1-C_4$ , nitro, trifluorométhyle, amino ou alkylamino en  $C_1-C_4$  ; un radical benzyle ; un radical benzyle substitué par un atome d'halogène ou par un radical alkyle en  $C_1-C_4$ , alcoxy en  $C_1-C_4$ , méthylènedioxy ou amino ; ou un radical



- dans lequel  $m$  et  $n$  sont des nombres entiers, identiques ou différents, compris entre 1 et 3 inclusivement,  $X$  représente un atome d'oxygène ou bien le groupement  $\text{NH}$ ,  $Y$  représente un atome d'hydrogène ou bien un radical méthyle, et
- 15  $Z$  représente un radical méthyle, un groupement  $\text{OR}$  ou  $\text{NRR}'$  dans lesquels  $R$  et  $R'$ , qui peuvent être identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, un radical méthyle ou un radical éthyle,


- étant entendu que lorsque  $R_2$  représente un atome d'hydrogène, alors  $R_3$  peut également représenter un radical amino ou alkylamino en  $C_1-C_4$ ,
- 20

- $R_6$  représente un radical alkyle en  $C_1-C_6$ , linéaire ou ramifié ; un radical hydroxyalkyle en  $C_1-C_4$  ; un radical aminoalkyle en  $C_1-C_4$  ; un radical phényle ; un radical phényle substitué par un atome d'halogène ou par un radical alkyle en  $C_1-C_4$ , alcoxy en  $C_1-C_4$ , nitro, trifluorométhyle, amino ou alkylamino en  $C_1-C_4$  ; un radical benzyle ; un radical benzyle substitué par un atome d'halogène ou par un radical alkyle en  $C_1-C_4$ , alcoxy en  $C_1-C_4$ , nitro, trifluorométhyle, amino ou alkylamino en  $C_1-C_4$  ; un hétérocycle choisi parmi le thiophène, le furane et la pyridine, ou encore un radical  $\text{---}(\text{CH}_2)_p\text{---O---}(\text{CH}_2)_q\text{---OR}''$ , dans lequel  $p$  et  $q$  sont des
- 25

nombres entiers, identiques ou différents, compris entre 1 et 3 inclusivement et R'' représente un atome d'hydrogène ou un radical méthyle,

étant entendu que dans la formule (I) ci-dessus :

- 5 - au moins un des radicaux R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> et R<sub>5</sub> représente un atome d'hydrogène,
- lorsque que R<sub>2</sub>, respectivement R<sub>4</sub>, représente un radical phényle substitué ou non, ou un radical benzyle ou un radical



alors R<sub>3</sub>, respectivement R<sub>5</sub>, ne peut représenter aucun de ces trois radicaux,

- 10 - lorsque R<sub>4</sub> et R<sub>5</sub> représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors R<sub>1</sub> peut former, avec R<sub>2</sub> et R<sub>3</sub>, un hétérocycle hexahydropyrimidinique ou tétrahydroimidazolique éventuellement substitué par un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ou 1,2,4-tétrazolique,
- lorsque R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> et R<sub>5</sub> représentent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en
- 15 C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alors R<sub>1</sub> ou R<sub>6</sub> peut également représenter un reste hétérocyclique 2, 3 ou 4-pyridyle, 2 ou 3-thiényle, 2 ou 3-furyle éventuellement substitué par un radical méthyle ou bien encore un radical cyclohexyle.

20 Comme indiqué précédemment, les colorations obtenues avec la composition de teinture d'oxydation conforme à l'invention sont puissantes et permettent d'atteindre des nuances allant du rouge au bleu. L'une des caractéristiques essentielles des bases d'oxydation conformes à l'invention, en particulier par rapport à celles décrites dans le document EP-A-375 977 précité, réside dans la présence d'un radical substituant R<sub>6</sub> sur le cycle pyrazole.

25

D'une manière générale, les sels d'addition avec un acide utilisables dans le cadre des compositions tinctoriales de l'invention (bases d'oxydation et coupleurs) sont notamment choisis parmi les chlorhydrates, les bromhydrates, les sulfates et les tartrates, les lactates et les acétates.

30



Parmi les 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués de formule (I), utilisables à titre de base d'oxydation dans les compositions conformes à l'invention, on peut notamment citer :

- 5 - le 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-(4'-méthylphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-(3'-méthylphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-isopropyl pyrazole,
- 10 - le 4,5-diamino 3-(4'-méthoxyphényl) 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-hydroxyméthyl pyrazole,
- 15 - le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-phényl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-(2'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-(3'-méthoxyphényl) pyrazole,
- 20 - le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 1-benzyl 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-(2'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-(3'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- 25 - le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-méthyl pyrazole,
- le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-éthyl pyrazole,
- le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-isopropyl pyrazole,
- le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-méthyl pyrazole,
- 30 - le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-éthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-méthyl pyrazole,

- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-éthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthylaminométhyl 1-méthyl pyrazole,
- 5 - le 4,5-diamino 3-méthylaminométhyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthylaminométhyl pyrazole,
- le 1-ter-butyl 4,5-diamino 3-méthylaminométhyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] 1-isopropyl pyrazole,
- 10 - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] pyrazole,
- le 1-ter-butyl 4,5-diamino 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1,3-diméthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-isopropyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole,
- 15 - le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-ter-butyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-phényl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-(2-méthoxyphényl) 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-(3-méthoxyphényl) 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-(4-méthoxyphényl) 3-méthyl pyrazole,
- 20 - le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-benzyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 1-éthyl 3-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- le 4-amino 1-ter-butyl 3-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- le 4,5-diamino 1,3-diméthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-tert.butyl 1-méthyl pyrazole,
- 25 - le 4,5-diamino 1-tert.butyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-méthyl 3-phényl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-phényl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-méthyl 3-(2'-chlorophényl) pyrazole,
- 30 - le 4,5-diamino 1-méthyl 3-(4'-chlorophényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-méthyl 3-(3'-trifluorométhylphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 1,3-diphényl pyrazole,

- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-phényl pyrazole,
- le 4-amino 1,3-diméthyl 5-phénylamino pyrazole,
- le 4-amino 1-éthyl 3-méthyl 5-phénylamino pyrazole,
- le 4-amino 1,3-diméthyl 5-méthylamino pyrazole,
- 5 - le 4-amino 3-méthyl 1-isopropyl 5-méthylamino pyrazole,
- le 4-amino 3-isobutoxyméthyl 1-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- le 4-amino 3-méthoxyéthoxyméthyl 1-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- le 4-amino 3-hydroxyméthyl 1-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- le 4-amino 1,3-diphényl 5-phénylamino pyrazole,
- 10 - le 4-amino 3-méthyl 5-méthylamino 1-phényl pyrazole,
- le 4-amino 1,3-diméthyl 5-hydrazino pyrazole,
- le 5-amino 3-méthyl 4-méthylamino 1-phényl pyrazole,
- le 5-amino 1-méthyl 4-(N,N-méthylphényl)amino 3-(4'-chlorophényl) pyrazole,
- le 5-amino 3-éthyl 1-méthyl 4-(N,N-méthylphényl)amino pyrazole,
- 15 - le 5-amino 1-méthyl 4-(N,N-méthylphényl)amino 3-phényl pyrazole,
- le 5-amino 3-éthyl 4-(N,N-méthylphényl)amino pyrazole,
- le 5-amino 4-(N,N-méthylphényl)amino 3-phényl pyrazole,
- le 5-amino 4-(N,N-méthylphényl)amino 3-(4'-méthylphényl) pyrazole,
- le 5-amino 3-(4'-chlorophényl) 4-(N,N-méthylphényl)amino pyrazole,
- 20 - le 5-amino 3-(4'-méthoxyphényl) 4-(N,N-méthylphényl)amino pyrazole,
- le 4-amino 5-méthylamino 3-phényl pyrazole,
- le 4-amino 5-éthylamino 3-phényl pyrazole,
- le 4-amino 5-éthylamino 3-(4'-méthylphényl) pyrazole,
- le 4-amino 3-phényl 5-propylamino pyrazole,
- 25 - le 4-amino 5-butylamino 3-phényl pyrazole,
- le 4-amino 3-phényl 5-phénylamino pyrazole,
- le 4-amino 5-benzylamino 3-phényl pyrazole,
- le 4-amino 5-(4'-chlorophényl)amino 3-phényl pyrazole,
- le 4-amino 3-(4'-chlorophényl) 5-phénylamino pyrazole,
- 30 - le 4-amino 3-(4'-méthoxyphényl) 5-phénylamino pyrazole,
- le 1-(4'-chlorobenzyl) 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4-amino 1-éthyl 3-méthyl 5-méthylamino pyrazole,

et leurs sels d'addition avec un acide.

Parmi ces 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués, on préfère plus particulièrement :

- 5 - le 4,5-diamino 1,3-diméthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 3-méthyl 1-phényl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-méthyl 3-phényl pyrazole,
  - le 4-amino 1,3-diméthyl 5-hydrazino pyrazole,
  - le 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole,
  - 10 - le 4,5-diamino 3-tert-butyl 1-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-tert-butyl 3-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
  - 15 - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-hydroxyméthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 3-méthyl 1-isopropyl pyrazole,
- et leurs sels d'addition avec un acide.

20

Le ou les 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués de formule (I) ci-dessus représentent de préférence de 0,0005 à 12 % en poids environ du poids total de la composition tinctoriale, et encore plus préférentiellement de 0,005 à 6 % en poids environ de ce poids.

25

Le milieu approprié pour la teinture (ou support) est généralement constitué par de l'eau ou par un mélange d'eau et d'au moins un solvant organique pour solubiliser les composés qui ne seraient pas suffisamment solubles dans l'eau. A titre de solvant organique, on peut par exemple citer les alcanols inférieurs en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, tels que l'éthanol et l'isopropanol ; le glycérol ; les glycols et éthers de glycols comme le 30 2-butoxyéthanol, le propylèneglycol, le monométhyléther de propylèneglycol, le monoéthyléther et le monométhyléther du diéthylèneglycol, ainsi que les alcools aromatiques comme l'alcool benzylique ou le phénoxyéthanol, les produits analogues et leurs mélanges.

Les solvants peuvent être présents dans des proportions de préférence comprises entre 1 et 40 % en poids environ par rapport au poids total de la composition tinctoriale, et encore plus préférentiellement entre 5 et 30 % en poids environ.

5

Le pH de la composition tinctoriale conforme à l'invention est généralement compris entre 3 et 12 environ, et de préférence entre 5 et 11 environ. Il peut être ajusté à la valeur désirée au moyen d'agents acidifiants ou alcalinisants habituellement utilisés en teinture des fibres kératiniques.


10

Parmi les agents acidifiants, on peut citer, à titre d'exemple, les acides minéraux ou organiques comme l'acide chlorhydrique, l'acide orthophosphorique, l'acide sulfurique, les acides carboxyliques comme l'acide acétique, l'acide tartrique, l'acide citrique, l'acide lactique, les acides sulfoniques.

15

Parmi les agents alcalinisants on peut citer, à titre d'exemple, l'ammoniaque, les carbonates alcalins, les alcanolamines telles que les mono-, di- et triéthanolamines ainsi que leurs dérivés, les hydroxydes de sodium ou de potassium et les composés de formule (II) suivante :

20



dans laquelle W est un reste propylène éventuellement substitué par un groupement hydroxyle ou un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ; R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub>, R<sub>10</sub> et R<sub>11</sub>, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène, un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ou hydroxyalkyle en

25 C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>.

La composition tinctoriale conforme à l'invention peut encore contenir, en plus des colorants définis ci-dessus, au moins une base d'oxydation additionnelle qui peut être choisie parmi les bases d'oxydation classiquement utilisées en teinture d'oxydation et parmi lesquelles on peut notamment citer les paraphénylènediamines, les bis-phénylalkylènediamines, les para-aminophénols, les ortho-aminophénols et

30

des bases hétérocycliques différentes des 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués utilisés conformément à l'invention.

Parmi les paraphénylènediamines, on peut plus particulièrement citer à titre  
5 d'exemple, la paraphénylènediamine, la paratolylènediamine, la 2,6-diméthyl  
paraphénylènediamine, la 2- $\beta$ -hydroxyéthyl paraphénylènediamine, la 2-n-propyl  
paraphénylènediamine, la 2-isopropyl paraphénylènediamine, la  
N-( $\beta$ -hydroxypropyl) paraphénylènediamine, la N,N-bis-( $\beta$ -hydroxyéthyl)  
paraphénylènediamine, la 4-amino N-( $\beta$ -méthoxyéthyl) aniline, les  
10 paraphénylènediamines décrites dans la demande de brevet français FR 2 630 438,  
et leurs sels d'addition avec un acide.

Parmi les bis-phénylalkylènediamines, on peut plus particulièrement citer à titre  
d'exemple, le N,N'-bis-( $\beta$ -hydroxyéthyl) N,N'-bis-(4'-aminophényl) 1,3-diamino  
15 propanol, la N,N'-bis-( $\beta$ -hydroxyéthyl) N,N'-bis-(4'-aminophényl) éthylènediamine, la  
N,N'-bis-(4'-aminophényl) tétraméthylènediamine, la N,N'-bis-( $\beta$ -hydroxyéthyl)  
N,N'-bis-(4'-aminophényl) tétraméthylènediamine, la N,N'-bis-(4-méthylaminophényl)  
tétraméthylènediamine, la N,N'-bis-(éthyl) N,N'-bis-(4'-amino, 3'-méthylphényl)  
éthylènediamine, et leurs sels d'addition avec un acide.

20

Parmi les para-aminophénols, on peut plus particulièrement citer à titre d'exemple, le  
para-aminophénol, le 4-amino 3-méthyl phénol, le 4-amino 3-fluoro phénol, le  
4-amino 3-hydroxyméthyl phénol, le 4-amino 2-méthyl phénol, le 4-amino  
2-hydroxyméthyl phénol, le 4-amino 2-méthoxyméthyl phénol, le 4-amino  
25 2-aminométhyl phénol, le 4-amino 2-( $\beta$ -hydroxyéthyl aminométhyl) phénol, et leurs  
sels d'addition avec un acide.

Parmi les ortho-aminophénols, on peut plus particulièrement citer à titre d'exemple,  
citer le 2-amino phénol, le 2-amino 5-méthyl phénol, le 2-amino 6-méthyl phénol, le  
30 5-acétamido 2-amino phénol, et leurs sels d'addition avec un acide.

Parmi les bases hétérocycliques, on peut plus particulièrement citer à titre  
d'exemple, les dérivés pyridiniques, les dérivés pyrimidiniques, les dérivés

pyrazoliques différents des 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués utilisés conformément à l'invention, et leurs sels d'addition avec un acide.

Lorsqu'elles sont utilisées, ces bases d'oxydation additionnelles représentent de  
5 préférence de 0,0005 à 12 % en poids environ du poids total de la composition tinctoriale, et encore plus préférentiellement de 0,005 à 6 % en poids environ de ce poids.

Les compositions de teinture d'oxydation conformes à l'invention peuvent également  
10 renfermer au moins un coupleur et/ou au moins un colorant direct, notamment pour modifier les nuances ou les enrichir en reflets.

Les coupleurs utilisables dans les compositions de teinture d'oxydation conformes à l'invention peuvent être choisis parmi les coupleurs utilisés de façon classique en  
15 teinture d'oxydation et parmi lesquels on peut notamment citer les métaphénylènediamines, les méta-aminophénols, les métadiphénols et les coupleurs hétérocycliques tels que par exemple les dérivés indoliques, les dérivés indoliniques, les dérivés pyridiniques et les pyrazolones, et leurs sels d'addition avec un acide.

20

Ces coupleurs sont plus particulièrement choisis parmi le 2-méthyl 5-amino phénol, le 5-N-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 2-méthyl phénol, le 3-amino phénol, le 1,3-dihydroxy benzène, le 1,3-dihydroxy 2-méthyl benzène, le 4-chloro 1,3-dihydroxy benzène, le 2,4-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthoxy) benzène, le 2-amino 4-( $\beta$ -hydroxyéthylamino)  
25 1-méthoxy benzène, le 1,3-diamino benzène, le 1,3-bis-(2,4-diaminophénoxy) propane, le sésamol, l' $\alpha$ -naphтол, le 6-hydroxy indole, le 4-hydroxy indole, le 4-hydroxy N-méthyl indole, la 6-hydroxy indoline, la 2,6-dihydroxy 4-méthyl pyridine, le 1-H 3-méthyl pyrazole 5-one, le 1-phényl 3-méthyl pyrazole 5-one, et leurs sels d'addition avec un acide.

30

Lorsqu'ils sont présents ces coupleurs représentent de préférence de 0,0001 à 10 % en poids environ du poids total de la composition tinctoriale et encore plus préférentiellement de 0,005 à 5 % en poids environ de ce poids.

La composition tinctoriale selon l'invention peut également renfermer divers adjuvants utilisés classiquement dans les compositions pour la teinture des cheveux, tels que des agents tensio-actifs anioniques, cationiques, non-ioniques, amphotères, 5 zwitterioniques ou leurs mélanges, des polymères anioniques, cationiques, non-ioniques, amphotères, zwitterioniques ou leurs mélanges, des agents épaississants minéraux ou organiques, des agents antioxydants, des agents de pénétration, des agents séquestrants, des parfums, des tampons, des agents dispersants, des agents de conditionnement tels que par exemple des silicones, des 10 agents filmogènes, des agents conservateurs, des agents opacifiants.

Bien entendu, l'homme de l'art veillera à choisir ce ou ces éventuels composés complémentaires de manière telle que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à la composition de teinture d'oxydation conforme à l'invention ne 15 soient pas, ou substantiellement pas, altérées par la ou les adjonctions envisagées.

La composition tinctoriale selon l'invention peut se présenter sous des formes diverses, telles que sous forme de liquides, de crèmes, de gels, ou sous toute autre forme appropriée pour réaliser une teinture des fibres kératiniques, et notamment 20 des cheveux humains.

L'invention a également pour objet un procédé de teinture des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux mettant en oeuvre la composition tinctoriale telle que définie précédemment. 25

Selon ce procédé, on applique sur les fibres au moins une composition tinctoriale telle que définie précédemment, pendant un temps suffisant pour développer la coloration désirée, soit à l'air, soit à l'aide d'un agent oxydant.

30 Selon une première forme de mise en oeuvre du procédé de l'invention, la coloration des fibres peut être effectuée sans addition d'un agent oxydant, au seul contact de l'oxygène de l'air. Dans ce cas, la composition tinctoriale peut alors éventuellement contenir des catalyseurs d'oxydation, afin d'accélérer le processus d'oxydation.



A titre de catalyseurs d'oxydation, on peut plus particulièrement citer les sels métalliques tels que les sels de manganèse, de cobalt, de cuivre, de fer, d'argent et de zinc.

5

De tels composés sont par exemple le diacétate de manganèse tétrahydrate, le dichlorure de manganèse et ses hydrates, le dihydrogénocarbonate de manganèse, l'acétylacétonate de manganèse, le triacétate de manganèse et ses hydrates, le trichlorure de manganèse, le dichlorure de zinc, le diacétate de zinc dihydrate, le  
10 carbonate de zinc, le dinitrate de zinc, le sulfate de zinc, le dichlorure de fer, le sulfate de fer, le diacétate de fer, le diacétate de cobalt tétrahydrate, le carbonate de cobalt, le dichlorure de cobalt, le dinitrate de cobalt, le sulfate de cobalt heptahydrate, le chlorure cuivrique, le nitrate d'argent ammoniacal.

15 Les sels de manganèse sont particulièrement préférés.

Lorsqu'ils sont utilisés, ces sels métalliques sont généralement mis en oeuvre dans des proportions variant entre 0,001 et 4 % en poids d'équivalent métal par rapport au poids total de la composition tinctoriale et de préférence entre 0,005 et 2 % en  
20 poids d'équivalent métal par rapport au poids total de la composition tinctoriale.

Selon une deuxième forme de mise en oeuvre du procédé de l'invention, on applique sur les fibres au moins une composition tinctoriale telle que définie précédemment, la couleur étant révélée à pH acide, neutre ou alcalin à l'aide d'un agent oxydant qui  
25 est ajouté juste au moment de l'emploi à la composition tinctoriale ou qui est présent dans une composition oxydante appliquée simultanément ou séquentiellement de façon séparée.

Selon cette deuxième forme de mise en oeuvre du procédé de teinture de  
30 l'invention, on mélange de préférence, au moment de l'emploi, la composition tinctoriale décrite ci-dessus avec une composition oxydante contenant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins un agent oxydant présent en une quantité suffisante pour développer une coloration. Le mélange obtenu est ensuite appliqué sur les fibres kératiniques et on laisse poser pendant 3 à 50 minutes environ, de

préférence 5 à 30 minutes environ, après quoi on rince, on lave au shampooing, on rince à nouveau et on sèche.

5 L'agent oxydant présent dans la composition oxydante telle que définie ci-dessus peut être choisi parmi les agents oxydants classiquement utilisés pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques, et parmi lesquels on peut citer le peroxyde d'hydrogène, le peroxyde d'urée, les bromates de métaux alcalins, les persels tels que les perborates et persulfates. Le peroxyde d'hydrogène est particulièrement préféré.

10

Le pH de la composition oxydante renfermant l'agent oxydant tel que défini ci-dessus est tel qu'après mélange avec la composition tinctoriale, le pH de la composition résultante appliquée sur les fibres kératiniques varie de préférence entre 3 et 12 environ, et encore plus préférentiellement entre 5 et 11. Il est ajusté à  
15 la valeur désirée au moyen d'agents acidifiants ou alcalinisants habituellement utilisés en teinture des fibres kératiniques et tels que définis précédemment.

La composition oxydante telle que définie ci-dessus peut également renfermer divers adjuvants utilisés classiquement dans les compositions pour la teinture des  
20 cheveux et tels que définis précédemment.


La composition qui est finalement appliquée sur les fibres kératiniques peut se présenter sous des formes diverses, telles que sous forme de liquides, de crèmes, de gels, ou sous toute autre forme appropriée pour réaliser une teinture des fibres  
25 kératiniques, et notamment des cheveux humains.

Un autre objet de l'invention est un dispositif à plusieurs compartiments ou "kit" de teinture ou tout autre système de conditionnement à plusieurs compartiments dont un premier compartiment renferme la composition tinctoriale telle que définie  
30 ci-dessus et un second compartiment renferme la composition oxydante telle que définie ci-dessus. Ces dispositifs peuvent être équipés d'un moyen permettant de délivrer sur les cheveux le mélange souhaité, tel que les dispositifs décrits dans le brevet FR-2 586 913 au nom de la demanderesse.

Certains composés de formule (I), utilisés à titre de base d'oxydation dans le cadre de la présente invention, sont nouveaux et, à ce titre, constituent un autre objet de l'invention.

5

Ces nouveaux 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués et leurs sels d'addition avec un acide répondent à la formule (I') suivante :



10

dans laquelle  $R'_1$ ,  $R'_2$ ,  $R'_3$ ,  $R'_4$ ,  $R'_5$  et  $R'_6$  ont les mêmes significations que celles indiquées précédemment pour les radicaux  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_5$  et  $R_6$  dans la formule (I), avec néanmoins les réserves suivantes :

- 15 (i) lorsque  $R'_1$  représente un radical méthyle, et que  $R'_2$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène et que  $R'_3$  représente un atome d'hydrogène ou un radical méthyle, alors  $R'_6$  est différent d'un radical hydroxyméthyle, isobutyloxyméthyle, méthoxyéthylloxyméthyle, cyclohexyle, thiophène, pyridine, phényle ou phényle substitué par un radical méthyle ou par un radical
- 20 trifluorométhyle ou par un atome de chlore ;

(ii) lorsque  $R'_1$  représente un radical phényle non substitué, et que  $R'_2$ ,  $R'_3$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors  $R'_6$  est différent d'un radical phényle non substitué ;

25

(iii) lorsque  $R'_1$  représente un radical phényle non substitué, et que  $R'_6$  représente un radical méthyle et que  $R'_2$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors  $R'_3$  est différent d'un atome d'hydrogène, d'un radical méthyle ou phényle non substitué ;

(iv) lorsque R'<sub>1</sub> représente un radical phényle non substitué, et que R'<sub>6</sub> représente un radical méthyle et que R'<sub>4</sub> et R'<sub>5</sub> représentent simultanément un atome d'hydrogène et que R'<sub>2</sub> représente un radical méthyle ou éthyle, alors R'<sub>3</sub> est  
5 différent d'un radical phényle non substitué ;

(v) lorsque R'<sub>1</sub> représente un radical phényle non substitué, et que R'<sub>6</sub> représente un radical méthyle et que R'<sub>2</sub>, R'<sub>3</sub> et R'<sub>5</sub> représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors R'<sub>4</sub> est différent d'un radical méthyle ;

10

(vi) lorsque R'<sub>2</sub>, R'<sub>3</sub>, R'<sub>4</sub> et R'<sub>5</sub> représentent simultanément un atome d'hydrogène, et que R'<sub>6</sub> représente un radical méthyle, alors R'<sub>1</sub> est différent d'un radical phényle substitué par un atome de chlore, par un radical trifluoroéthyle, nitro ou pyridyle ;

15 (vii) lorsque R'<sub>1</sub> représente un atome d'hydrogène, et que R'<sub>6</sub> représente un radical phényle ou un radical phényle substitué par un atome de chlore, par un radical méthyle ou méthoxy et que R'<sub>2</sub>, R'<sub>4</sub> et R'<sub>5</sub> représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors R'<sub>3</sub> est différent d'un atome d'hydrogène, d'un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ou phényle non substitué ;

20

(viii) lorsque R'<sub>1</sub>, R'<sub>2</sub>, R'<sub>3</sub>, R'<sub>4</sub> et R'<sub>5</sub> représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors R'<sub>6</sub> est différent d'un radical méthyle ;

(ix) lorsque R'<sub>1</sub> représente un radical  $\beta$ -hydroxyéthyle, et que R'<sub>2</sub>, R'<sub>3</sub>, R'<sub>4</sub> et R'<sub>5</sub>  
25 représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors R'<sub>6</sub> est différent d'un radical méthyle ou phényle non substitué ;

(x) lorsque R'<sub>4</sub> représente un radical méthyle, et que R'<sub>5</sub> représente un radical phényle non substitué et que R'<sub>2</sub> et R'<sub>3</sub> représentent simultanément un atome  
30 d'hydrogène et que R'<sub>1</sub> représente un atome d'hydrogène ou un radical méthyle, alors R'<sub>6</sub> est différent d'un radical phényle non substitué ou d'un radical phényle substitué par un radical méthyle, éthyle, méthoxy ou par un atome de chlore ;

- (xi) lorsque  $R'_1$  représente un radical ter-butyle, et que  $R'_2$ ,  $R'_3$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors  $R'_6$  est différent d'un radical méthyle ;
- 5 (xii) lorsque  $R'_1$  représente un radical pyridyle, et que  $R'_2$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène et que  $R'_3$  représente un atome d'hydrogène ou un radical méthyle, alors  $R'_6$  est différent d'un radical méthyle ou phényle non substitué ;
- 10 (xiii) lorsque  $R'_1$  représente un radical méthyle, éthyle ou 4-aminophényle, et que  $R'_2$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène et que  $R'_3$  représente un atome d'hydrogène ou un radical phényle non substitué alors  $R'_6$  est différent d'un radical méthyle ;
- 15 (xiv) lorsque  $R'_1$  représente un radical isopropyle, et que  $R'_2$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors au moins un des radicaux  $R'_3$  et  $R'_6$  est différent d'un radical méthyle ;
- (xv) lorsque  $R'_1$  représente un atome d'hydrogène ou un radical phényle non substitué, et que  $R'_2$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène et  
20 que  $R'_3$  représente un radical benzyle ou un radical phényle substitué par un radical méthyle ou par un atome de chlore, alors  $R'_6$  est différent d'un radical méthyle ou phényle non substitué.
- 25 Parmi les nouveaux composés de formule (I'), on peut notamment citer :
- le 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-(4'-méthoxyphényle) pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-(4'-méthylphényle) pyrazole,

30 - le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-(3'-méthylphényle) pyrazole,

  - le 4,5-diamino 3-méthyl 1-isopropyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 3-(4'-méthoxyphényle) 1-isopropyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole,

- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-hydroxyméthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole,
- 5 - le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-phényl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-(2'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-(3'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- 10 - le 1-benzyl 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-(2'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-(3'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-méthyl pyrazole,
- 15 - le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-éthyl pyrazole,
- le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-isopropyl pyrazole,
- le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-éthyl pyrazole,
- 20 - le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-éthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-isopropyl pyrazole,
- 25 - le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthylaminométhyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthylaminométhyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthylaminométhyl pyrazole,
- le 1-ter-butyl 4,5-diamino 3-méthylaminométhyl pyrazole,
- 30 - le 4,5-diamino 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] pyrazole,
- le 1-ter-butyl 4,5-diamino 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] pyrazole,

- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1,3-diméthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-isopropyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-ter-butyl 3-méthyl pyrazole,
- 5 - le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-phényl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-(2'-méthoxyphényl) 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-(3'-méthoxyphényl) 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-(4'-méthoxyphényl) 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-benzyl 3-méthyl pyrazole,
- 10 - le 4-amino 1-éthyl 3-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- le 4-amino 1-ter-butyl 3-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- le 1-(4'-chlorobenzyl) 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4-amino 1-éthyl 3-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- 15 et leurs sels d'addition avec un acide.


Parmi les nouveaux composés de formule (I'), on préfère plus particulièrement :

- le 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole,
  - 20 - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-(4'-méthoxyphényl) pyrazole
  - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-hydroxyméthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole,
  - 25 - le 4,5-diamino 3-méthyl 1-isopropyl pyrazole,
- et leurs sels d'addition avec un acide.

L'invention a également pour objet les procédés de préparation des composés nouveaux de formule (I').

30

Lorsque  $R'_6$  représente un radical méthyle et que  $R'_1$  est différent d'un atome d'hydrogène, (composés de formule (I'A) ci-dessous), on utilise de préférence le procédé A répondant au schéma de synthèse suivant :



consistant à faire réagir, dans une première étape, un 3-aminocrotononitrile ① avec une hydrazine monosubstituée ②, à une température généralement supérieure à 90°C, et de préférence comprise entre 95 et 150°C, dans un solvant alcoolique, puis, dans une deuxième étape, à nitroser le 5-aminopyrazole ③ en position 4, par réaction avec un nitrite minéral ou organique pour donner le 5-amino 4-nitrosopyrazole ④ qui conduit, dans une troisième étape, par hydrogénation catalytique aux 4,5-diamino pyrazoles de formule (I'A).

10

Pour un bon contrôle de la température lors de la première étape, on préfère généralement opérer au reflux du solvant utilisé. Parmi les alcools utilisés à titre de solvant réactionnel, on peut plus particulièrement citer le n-propanol, le 1-butanol, le 2-butanol, le 2-méthyl 1-butanol, le 3-méthyl 1-butanol, le 2-méthyl 1-propanol, le n-pentanol, le 2-pentanol, le 3-méthyl 3-pentanol, le 4-méthyl 2-pentanol ou encore le 2-éthyl 1-butanol.

15

Parmi les nitrites minéraux, on peut par exemple utiliser le nitrite de sodium ou de potassium, en milieu acide acétique aqueux, à une température comprise de préférence entre 0 et 5°C.

20


Parmi les nitrites organiques, on peut par exemple utiliser le nitrite d'isoamyle, en conduisant la réaction à température ambiante, dans un alcool inférieur en présence d'un acide tel que l'acide chlorhydrique ou l'acide acétique.



L'hydrogénation catalytique des composés ④ est de préférence effectuée dans un alcool inférieur, en présence d'un catalyseur tel que le palladium sur charbon, à une température généralement comprise entre 20 et 100°C.

5

Lorsque  $R'_6$  est différent d'un radical méthyle et lorsque  $R'_1$  est différent d'un atome d'hydrogène, (composés de formule (I'B) ci-dessous), on utilise de préférence le procédé B répondant au schéma de synthèse suivant :



10

consistant à faire réagir, dans une première étape, un  $\beta$ -cétoacétonitrile ⑤ avec une hydrazine monosubstituée ②, à une température généralement comprise entre 20 et 150°C, dans un solvant alcoolique, pour obtenir le 5-aminopyrazole ⑥ qui est ensuite nitrosé en position 4, dans une deuxième étape, pour donner un 4-nitro 5-amino pyrazole ⑦ qui est ensuite lui-même hydrogéné, dans une troisième étape, pour conduire aux 4,5-diamino pyrazoles de formule (I'B).


15

Les solvants utilisés selon ce procédé B sont les mêmes que ceux cités pour le procédé A décrit précédemment.

20

Les réactions de nitrosation et d'hydrogénation sont réalisées selon les conditions décrites pour le procédé A décrit précédemment.


Lorsque  $R'_6$  représente un radical à fort encombrement stérique, (composés de formule (I'C) ci-dessous), on utilise de préférence le procédé C répondant au schéma de synthèse suivant :



5

- consistant à faire réagir, dans une première étape, un  $\beta$ -cétoacétonitrile ⑤ avec une hydrazine monosubstituée ② pour obtenir un 5-aminopyrazole ⑥ selon les conditions opératoires mentionnées pour le procédé B décrit précédemment. Le
- 10 5-aminopyrazole ⑥ est ensuite acétylé en position 5, dans une deuxième étape, pour conduire à un 5-acétylamino pyrazole ⑧ qui est lui-même ensuite nitré en position 4 et désacétylé en position 5, dans une troisième étape, pour donner un 5-amino 4-nitro pyrazole ⑨, de préférence par l'acide nitrique fumant en milieu sulfurique concentré, à une température de préférence comprise entre 0 et 5°C. Le
- 15 5-amino 4-nitro pyrazole ⑨ est ensuite hydrogéné, dans une quatrième étape, selon les conditions opératoires mentionnées dans le procédé A ci-dessus, pour conduire aux 4,5-diamino pyrazoles de formule (I'C).

- Lorsque l'un des radicaux  $R'_2$  ou  $R'_3$  est différent d'un atome d'hydrogène,
- 20 (composés de formule (I'D) ci-dessous), on utilise de préférence le procédé D répondant au schéma de synthèse suivant :




consistant à faire réagir, dans une première étape, un  $\beta$ -cétoester (10) avec une hydrazine ②, pour obtenir un 5-hydroxypyrazole (11), qui est en équilibre avec sa forme tautomère pyrazol-5-one, tel que décrit par exemple dans Org. Synth., Edward  
 5 C. TAYLOR, (1976), 55, 73-7. Le 5-hydroxypyrazole (11) est ensuite nitré en position 4, dans une deuxième étape, puis chloré en position 5, dans une troisième étape, selon la méthode telle que décrite par exemple dans le brevet US 4 025 530. Le 5-chloro 4-nitro pyrazole (13) conduit ensuite, dans une quatrième étape, en présence d'une amine primaire  $H_2N-R'_3$ , à un 5-amino 4-nitro pyrazole (14), puis  
 10 dans une cinquième étape, par hydrogénation catalytique, selon la méthode décrite ci-dessus pour le procédé A, aux 4,5-diamino pyrazoles de formule (I'D).

Les exemples qui suivent sont destinés à illustrer l'invention sans pour autant en limiter la portée.

## EXEMPLES DE PREPARATION

**EXEMPLE DE PREPARATION 1 : Synthèse du dichlorhydrate du 4,5-diamino 1,3-diméthyl pyrazole**

5

**a) Préparation du 5-amino 1,3-diméthyl pyrazole**

- 10 A une solution de 16,5 g (0,2 mole) de 3-aminocrotononitrile dans 40 cm<sup>3</sup> de n-pentanol, on a ajouté 12,9 g (0,28 mole) de méthylhydrazine. La solution a été portée au reflux pendant 3 heures. Le pentanol, ainsi que l'excès de méthylhydrazine, ont ensuite été distillés sous pression réduite. Le précipité beige obtenu a été repris par 150 cm<sup>3</sup> d'heptane, essoré sur verre fritté puis séché sous
- 15 vide à une température de 40°C. On a obtenu 13,5 g de 5-amino 1,3-diméthyl pyrazole sous forme d'un solide beige dont le point de fusion était compris entre 80 et 81°C.

**b) Préparation du 5-amino 1,3-diméthyl 4-nitroso pyrazole**

20


- A une solution de 11,1 g (0,1 mole) de 5-amino 1,3-diméthyl pyrazole, obtenu à l'étape précédente, dans 125 cm<sup>3</sup> d'éthanol absolu, on a ajouté goutte à goutte 1 cm<sup>3</sup> d'acide chlorhydrique 12 N, puis 13,5 cm<sup>3</sup> de nitrite d'isoamyle à 0°C. La solution a ensuite été ramenée et laissée à température ambiante pendant 4 heures. Le milieu
- 25 réactionnel a alors été filtré sur verre fritté et le précipité obtenu a été lavé par 100 cm<sup>3</sup> d'éther isopropylique. Après séchage sous vide à température ambiante, on a obtenu 7,5 g de 5-amino 1,3-diméthyl 4-nitroso pyrazole sous forme d'un solide orangé dont le point de fusion était compris entre 169 et 171°C.

c) Préparation du dichlorhydrate du 4,5-diamino 1,3-diméthyl pyrazole

A une solution de 7 g (0,05 mole) de 5-amino 1,3-diméthyl pyrazole, obtenu à l'étape précédente, dans 200 cm<sup>3</sup> d'éthanol, on a ajouté 1,2 g de palladium sur charbon à 5 % en poids et contenant 50 % d'eau. La suspension a été placée dans un hydrogénéateur sous une pression d'hydrogène de 10 bars, à une température de 75°C, pendant 3 heures, sous vive agitation. Le milieu réactionnel a été versé dans une solution de 50 cm<sup>3</sup> d'éthanol et de 17 cm<sup>3</sup> d'acide chlorhydrique 12 N refroidie à 0°C. Cette solution a ensuite été clarifiée par filtration sur verre fritté, puis évaporée à sec sous pression réduite. Le solide brun obtenu a été repris au reflux de 45 cm<sup>3</sup> d'éthanol chlorhydrique 5 N et de 13 cm<sup>3</sup> d'eau, puis on a refroidi à température ambiante. Le précipité blanc obtenu a été essoré sur verre fritté, puis séché sous vide à température ambiante. On a obtenu 5,7 g de dichlorhydrate de 4,5-diamino 1,3-diméthyl pyrazole, sous forme de cristaux blancs dont le point de décomposition était compris entre 210 et 212 °C. L'analyse élémentaire calculée pour C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>N<sub>4</sub>, 2 HCl était :

	%	C	H	N	Cl
Calculé		30,17	6,08	28,14	35,62
Trouvé		30,15	6,08	28,07	35,77

20 EXEMPLE DE PREPARATION 2 : Synthèse du dichlorhydrate du 4,5-diamino 3-méthyl 1-phényl pyrazole



a) Préparation du 5-amino 3-méthyl 4-nitroso 1-phényl pyrazole


A une solution de 17,3 g (0,1 mole) de 5-amino 3-méthyl 1-phényl pyrazole dans 200 cm<sup>3</sup> d'éthanol absolu, on a ajouté goutte à goutte 0,5 cm<sup>3</sup> d'acide chlorhydrique 12 N puis 13,5 cm<sup>3</sup> de nitrite d'isoamyle à 0°C. La solution a ensuite été ramenée et laissée à température ambiante pendant 4 heures. Un solide orange a cristallisé. Ce solide a été essoré sur verre fritté et lavé par 100 cm<sup>3</sup> d'éther isopropylique. Après séchage sous vide à température ambiante, on a obtenu 17 g de 5-amino 3-méthyl 4-nitroso 1-phényl pyrazole sous forme d'un solide orange dont le point de fusion était compris entre 202 et 204 °C.

b) Préparation du dichlorhydrate de 4,5-diamino 3-méthyl 1-phényl pyrazole

A une solution de 10 g (0,05 mole) de 5-amino 3-méthyl 4-nitroso 1-phényl pyrazole, obtenu à l'étape précédente, dans 80 cm<sup>3</sup> d'éthanol absolu et 20 cm<sup>3</sup> d'acide chlorhydrique 2 N, on a ajouté 1,2 g de palladium sur charbon à 5% en poids contenant 50 % d'eau. La suspension a été placée dans un hydrogénéateur, sous une pression d'hydrogène de 10 bars, à une température de 75°C, sous vive agitation, pendant 3 heures. Le contenu de l'hydrogénéateur a ensuite été récupéré et filtré sur verre fritté. Le filtrat a été coulé dans une solution à 0°C de 70 cm<sup>3</sup> d'éthanol absolu et de 30 cm<sup>3</sup> d'acide chlorhydrique 12 N puis évaporé à sec. Le résidu a été repris par 100 cm<sup>3</sup> d'éther isopropylique : un solide beige a cristallisé. Ce solide a été essoré sur verre fritté puis lavé par 100 cm<sup>3</sup> d'éther isopropylique et purifié par recristallisation dans un mélange de 100 cm<sup>3</sup> d'eau et de 50 cm<sup>3</sup> d'une solution éthanolique d'acide chlorhydrique 3,5 M. Le solide cristallisé a été essoré sur verre fritté, lavé par 100 cm<sup>3</sup> d'éther isopropylique et séché sous vide à température ambiante. On a obtenu 8 g de dichlorhydrate de 4,5-diamino 3-méthyl 1-phényl pyrazole sous forme d'un solide blanc, dont le point de fusion était compris entre 208 et 210 °C. L'analyse élémentaire calculée pour C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>N<sub>4</sub>, 2 HCl était :

	%	C	H	N	Cl
Calculé		45,99	5,40	21,45	27,15
Trouvé		46,17	5,40	21,32	27,10

**EXEMPLE DE PREPARATION 3 : Synthèse du dichlorhydrate du 4,5-diamino 1-méthyl 3-phényl pyrazole**



5

a) Préparation du 5-amino 1-méthyl 3-phényl pyrazole

A une solution de 29 g (0,2 mole) de benzoylacétonitrile dans 100 cm<sup>3</sup> de n-pentanol, on a ajouté 14,7 cm<sup>3</sup> (0,28 mole) de méthylhydrazine et on a chauffé au reflux pendant 2 heures. On a ensuite distillé le n-pentanol ainsi que l'excès de méthylhydrazine sous pression réduite. On a obtenu un solide beige qui a été repris par 100 cm<sup>3</sup> d'heptane à température ambiante et essoré sur verre fritté. Après séchage sous vide à une température de 40 °C, on a obtenu 27 g de 5-amino 1-méthyl 3-phényl pyrazole sous forme d'un solide beige dont le point de fusion était compris entre 104 et 106 °C.

15

b) Préparation du 5-amino 1-méthyl 4-nitroso 3-phényl pyrazole

A une solution de 17,3 g (0,1 mole) de 5-amino 1-méthyl 3-phényl pyrazole, obtenu à l'étape précédente, dans 200 cm<sup>3</sup> d'éthanol absolu, on a ajouté goutte à goutte 0,5 cm<sup>3</sup> d'acide chlorhydrique 12 N puis 13,5 cm<sup>3</sup> de nitrite d'isoamyle à 0°C. La solution a ensuite été ramenée et laissée à température ambiante pendant 4 heures. Un solide orange a cristallisé. Il a été essoré sur verre fritté et lavé par 100 cm<sup>3</sup> d'éther isopropylique. Après séchage sous vide à température ambiante, on a obtenu 17 g de 5-amino 1-méthyl 4-nitroso 3-phényl pyrazole sous forme d'un solide orange dont le point de fusion était compris entre 224 et 226 °C.

25

c) Préparation du dichlorhydrate du 4,5-diamino 1-méthyl 3-phényl pyrazole


A une solution de 10 g (0,05 mole) de 5-amino 1-méthyl 4-nitroso 3-phényl pyrazole, obtenu à l'étape précédente, dans 80 cm<sup>3</sup> d'éthanol absolu et 20 cm<sup>3</sup> d'une solution  
 5 d'acide chlorhydrique 2 N, on a ajouté 1,2 g de palladium sur charbon à 5 % en poids contenant 50 % d'eau. La suspension a été placée dans un hydrogénéateur, sous une pression d'hydrogène de 10 bars, à une température de 75 °C, pendant 3 heures sous vive agitation. Le contenu de l'hydrogénéateur a été récupéré et filtré sur verre fritté. Le filtrat a été coulé dans une solution de 70 cm<sup>3</sup> d'éthanol absolu et  
 10 de 30 cm<sup>3</sup> d'acide chlorhydrique 12 N refroidie à 0°C. Un solide blanc a précipité. Ce précipité a été essoré sur verre fritté puis lavé par 100 cm<sup>3</sup> d'éther isopropylique. Après séchage sous vide à température ambiante, on a obtenu 10 g de dichlorhydrate de 4,5-diamino 1-méthyl 3-phényl pyrazole qui ont été purifiés par recristallisation dans un mélange de 30 cm<sup>3</sup> d'eau et de 50 cm<sup>3</sup> d'une solution  
 15 éthanolique d'acide chlorhydrique 3,5 M. Le solide recristallisé a été essoré sur verre fritté, lavé par 100 cm<sup>3</sup> d'éther isopropylique et séché sous vide à température ambiante. On a obtenu 8 g de dichlorhydrate de 4,5-diamino 1-méthyl 3-phényl pyrazole, sous la forme d'un solide blanc, dont le point de fusion était compris entre 218 et 220 °C, l'analyse élémentaire calculée pour C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>N<sub>4</sub>, 2 HCl était :

20

	%	C	H	N	Cl
Calculé		45,99	5,40	21,45	27,15
Trouvé		46,27	5,60	21,32	27,10

EXEMPLE DE PREPARATION 4 : Synthèse du dichlorhydrate du 4-amino 1,3-diméthyl 5-hydrazino pyrazole

25




Une suspension de 8,6 g (0,05 mole) de 1,3-diméthyl 5-hydrazino 4-nitro pyrazole et de 1,5 g de palladium sur charbon à 5 % en poids contenant 50 % d'eau dans



200 cm<sup>3</sup> d'éthanol a été placée dans un hydrogénateur. Après agitation sous une pression d'hydrogène de 10 bars, à une température de 75°C pendant 3 heures, le milieu réactionnel a été versé dans une solution de 60 cm<sup>3</sup> d'éthanol et de 20 cm<sup>3</sup> d'acide chlorhydrique 12 N refroidie à 0°C. La solution a été clarifiée par filtration sur verre fritté, puis évaporée à sec sous pression réduite. Le solide brun obtenu a été repris au reflux de 50 cm<sup>3</sup> d'éthanol chlorhydrique 5 N et de 14 cm<sup>3</sup> d'eau, puis on a refroidi à température ambiante. Le précipité blanc obtenu a été essoré sur verre fritté, puis séché sous vide à température ambiante. On a obtenu 9,5 g de dichlorhydrate de 4-amino 1,3-diméthyl 5-hydrazino pyrazole sous forme de cristaux blancs dont le point de fusion était compris entre 202 et 204°C. L'analyse élémentaire calculée pour C<sub>5</sub>H<sub>11</sub>N<sub>5</sub>, 2 HCl était :

%	C	H	N	Cl
Calculé	28,05	6,12	32,71	33,12
Trouvé	28,52	6,20	32,96	32,88

**EXEMPLE DE PREPARATION 5 :** Synthèse du dichlorhydrate du 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole



a) Préparation du 5-amino 1-benzyl 3-méthyl pyrazole

20

A une solution de 16,4 g (0,2 mole) de 3-amino crotononitrile dans 100 cm<sup>3</sup> de n-pentanol, on a ajouté 26,9 g (0,22 mole) de benzylhydrazine puis on a chauffé au reflux pendant 12 heures. Le n-pentanol a ensuite été distillé sous pression réduite, on a obtenue une huile épaisse qui a été purifiée par chromatographie sur gel de silice. On a obtenu un solide jaune pâle qui a cristallisé dans l'éther isopropylique et qui a été essoré sur verre fritté. Après séchage sous vide à 40°C, on a obtenu 17 g

25

du produit attendu sous forme d'un solide jaune pâle dont le point de fusion était compris entre 76 et 78°C.

b) Préparation du 5-amino 1-benzyl 3-méthyl 4-nitroso pyrazole

5

A une solution de 18,7 g (0,1 mole) de 5-amino 1-benzyl 3-méthyl pyrazole, obtenu à l'étape précédente, dans 200 cm<sup>3</sup> d'éthanol absolu, on a ajouté goutte à goutte 0,5 cm<sup>3</sup> d'acide chlorhydrique 12 N, puis 13,5 cm<sup>3</sup> de nitrite d'isoamyle à 0°C. La solution a ensuite été ramenée et laissée à température ambiante pendant 4 heures.

10 Un solide orange a cristallisé. Il a été essoré sur verre fritté et lavé par 100 cm<sup>3</sup> d'éthanol puis par 100 cm<sup>3</sup> d'éther isopropylique. Après séchage sous vide à température ambiante, on a obtenu 13 g du produit attendu sous la forme d'un solide orange dont le point de fusion était compris entre 178 et 180°C.

15 c) Préparation du dichlorhydrate du 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole

A une solution de 5 g (0,02 mole) de 5-amino 1-benzyl 3-méthyl 5-nitroso pyrazole, obtenu à l'étape précédente, dans 200 cm<sup>3</sup> de méthanol, on a ajouté 0,9 g de palladium sur charbon à 5 % en poids et contenant 50 % d'humidité.


20 La suspension a été placée dans un hydrogénéateur, sous une pression de 20 bars d'hydrogène, à température ambiante, pendant 3 heures, sous vive agitation. Le contenu de l'hydrogénéateur a été prélevé et filtré sur verre fritté. Le filtrat a ensuite été coulé dans 100 cm<sup>3</sup> d'une solution d'éthanol chlorhydrique 3,5 M. Cette solution a été concentrée sous vide. On a obtenu une huile épaisse, qui a cristallisé par ajout  
25 de 50 cm<sup>3</sup> d'acétone. On a obtenu un solide qui a été essoré sur verre fritté.

Après séchage sous vide à température ambiante, on a obtenu 6 g de dichlorhydrate du 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole sous forme d'un solide blanc dont le point de fusion était compris entre 190 et 192°C. L'analyse élémentaire calculée pour C<sub>11</sub>H<sub>14</sub>N<sub>4</sub>, 2 HCl était :

	%	C	H	N	Cl
Calculé		48,01	5,86	20,36	25,77
Trouvé		48,03	5,90	20,40	25,75

**EXEMPLE DE PREPARATION 6 : Synthèse du dichlorhydrate du 4,5-diamino**

**5 1-méthyl 3-ter-butyl pyrazole**



**a) Préparation du 5-amino 1-méthyl 3-ter-butyl pyrazole**

10

A une solution de 12,5 g (0,1 mole) de 4,4-diméthyl 3-oxo pentanitrile dans 50 cm<sup>3</sup> de n-propanol, on a ajouté, à température ambiante, 4,6 g (0,1 mole) de méthylhydrazine. Le milieu réactionnel a été porté au reflux pendant 1 heure, puis refroidi à température ambiante. Le solide blanc obtenu a été essoré sur verre fritté puis lavé à l'éther isopropylique. Après séchage sous vide à 40°C, on a obtenu 10 g du produit attendu sous forme d'un solide beige dont le point de fusion était de 157°C.

15

**b) Préparation du 5-acétamido 1-méthyl 3-ter-butyl pyrazole**

20

A une solution de 10 g (0,065 mole) de 5-amino 1-méthyl 3-ter-butyl pyrazole, obtenu à l'étape précédente, dans 25 cm<sup>3</sup> d'acide acétique, on a ajouté, à température ambiante, 13,5 cm<sup>3</sup> (0,13 mole) d'anhydride acétique. Après 1 heure d'agitation, le milieu réactionnel a été versé sur 100 cm<sup>3</sup> de glace. On a extrait la solution par trois fois 100 cm<sup>3</sup> de dichlorométhane, séché la phase organique sur sulfate de sodium, puis distillé celle-ci sous vide à l'évaporateur rotatif. Le solide obtenu a été repris par 100 cm<sup>3</sup> d'éther isopropylique, essoré sur verre fritté, puis

25

séché sous vide à 40°C. On a obtenu 12 g du produit attendu sous forme d'un solide beige que l'on a recristallisé dans 30 cm<sup>3</sup> d'acétate d'éthyle pour isoler 8,5 g du produit attendu sous forme de cristaux blancs dont le point de fusion était de 138°C.

5 c) Préparation du 5-amino 1-méthyl 4-nitro 3-ter-butyl pyrazole


A 30 cm<sup>3</sup> d'acide sulfurique concentré, on a ajouté 8,5 g (0,044 mole) de 5-acétamido 1-méthyl 3-ter-butyl pyrazole à 5°C sous vive agitation, puis 2,5 cm<sup>3</sup> (0,066 mole) d'acide nitrique fumant. Après 2 heures d'agitation, le mélange  
10 réactionnel a été versé sur 100 g de glace et agité pendant 30 minutes. Le solide obtenu a été essoré sur verre fritté, lavé par 20 cm<sup>3</sup> d'eau, puis séché sous vide à 40°C. On a obtenu 8,5 g du produit attendu sous forme d'un solide jaune dont le point de fusion était de 124°C.

15 d) Préparation du dichlorhydrate du 4,5-diamino 1-méthyl 3-ter-butyl pyrazole

Une suspension de 8,5 g (0,035 mole) de 5-amino 1-méthyl 4-nitro 3-ter-butyl pyrazole et de 1,5 g de palladium sur charbon à 5% en poids et contenant 50 % d'eau dans 200 cm<sup>3</sup> d'éthanol a été placée dans un hydrogénateur. Après agitation  
20 pendant 3 heures, sous une pression d'hydrogène de 10 bars, à une température de 75°C, le milieu réactionnel a été versé dans une solution, préalablement refroidie à 0°C, de 60 cm<sup>3</sup> d'éthanol et de 20 cm<sup>3</sup> d'acide chlorhydrique 12 N. La solution a été clarifiée par filtration sur verre fritté, puis évaporée à sec sous pression réduite. Le solide brun obtenu a été repris au reflux de 35 cm<sup>3</sup> d'éthanol chlorhydrique 5 N et de  
25 11 cm<sup>3</sup> d'eau, puis refroidi à température ambiante. Les cristaux blancs obtenus ont été essorés sur verre fritté puis séchés sous vide à température ambiante. On a obtenu 4,9 g du produit attendu sous forme de cristaux blancs dont le point de fusion était de 260°C. L'analyse élémentaire pour C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>N<sub>4</sub>, 2 HCl était :

	%	C	H	N	Cl
Calculé		39,84	7,52	23,23	29,40
Trouvé		39,73	7,63	23,16	29,20

**EXEMPLE DE PREPARATION 7 : Synthèse du dichlorhydrate du 4,5-diamino 3-méthyl 1-ter-butyl pyrazole**



5

a) Préparation du 5-amino 3-méthyl 1-ter-butyl pyrazole

A une solution de 16,4 g (0,2 mole) de 3-aminocrotononitrile dans 100 cm<sup>3</sup> de  
 10 n-pentanol, on a ajouté 19,4 g (0,22 mole) de ter-butylhydrazine. Cette solution a été  
 chauffée au reflux pendant 20 heures. Le n-pentanol a ensuite été distillé sous  
 pression réduite. On a obtenu un solide jaune pâle qui a été repris par 100 cm<sup>3</sup>  
 d'éther isopropylique à température ambiante et essoré sur verre fritté. Après  
 séchage sous vide à 40°C, on a obtenu 18 g du produit attendu sous forme d'un  
 15 solide jaune pâle dont le point de fusion était compris entre 172 et 175°C.

b) Préparation du 5-amino 3-méthyl 4-nitroso 1-ter-butyl pyrazole

A une solution de 15,3 g (0,1 mole) de 5-amino 3-méthyl 1-ter-butyl pyrazole, obtenu  
 20 à l'étape précédente, dans 200 cm<sup>3</sup> d'éthanol absolu, on a ajouté goutte à goutte  
 0,5 cm<sup>3</sup> d'acide chlorhydrique 12 N, puis 13,5 cm<sup>3</sup> (0,1 mole) de nitrite d'isoamyle à  
 0°C. La solution a ensuite été ramenée et laissée à température ambiante pendant 4  
 heures.


L'éthanol a été évaporé sous pression de 175 m-bars, à 40°C. Un solide orange a  
 25 cristallisé dans l'heptane à 0°C, puis a été essoré sur verre fritté. Après séchage  
 sous vide à température ambiante, on a obtenu 11 g du produit attendu, sous forme  
 d'un solide orange dont le point de fusion était de 120°C.

c) Préparation du 4,5-diamino 3-méthyl 1-ter-butyl pyrazole

A une solution de 9 g (0,05 mole) de 5-amino 3-méthyl 4-nitroso 1-ter-butyl pyrazole, obtenu à l'étape précédente, dans 600 cm<sup>3</sup> d'éthanol absolu, on a ajouté 2 g de palladium sur charbon à 5 % en poids et contenant 50 % d'eau. La suspension a été placée dans un hydrogénateur, sous une pression de 20 bars d'hydrogène, à température ambiante, pendant 4 heures, sous vive agitation. Le contenu de l'hydrogénateur a été prélevé et filtré sur verre fritté. Le filtrat a ensuite été coulé dans 100 cm<sup>3</sup> d'une solution d'éthanol chlorhydrique 3,5 M. Cette solution a été concentrée sous vive jusqu'à début de cristallisation. Les cristaux ont ensuite été lavés avec une solution d'éthanol chlorhydrique 3,5 M, puis essoré sur verre fritté. On a obtenu un solide blanc qui a été recristallisé dans un mélange de 40 cm<sup>3</sup> d'éthanol chlorhydrique 3,5 M et de 12 cm<sup>3</sup> d'eau distillée. Après séchage sous vide à température ambiante, on a obtenu 8 g du produit attendu sous forme de cristaux blancs dont le point de fusion était compris entre 252 et 255°C. L'analyse élémentaire pour C<sub>8</sub>H<sub>16</sub>N<sub>4</sub>, 2 HCl était :

	%	C	H	N	Cl
Calculé		39,84	7,52	23,23	29,40
Trouvé		39,70	7,49	23,37	29,44

20 EXEMPLE DE PREPARATION 8 : Synthèse du dichlorhydrate du 4,5-diamino 1-β-hydroxyéthyl 3-méthyl pyrazole



a) Préparation du 5-amino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-méthyl pyrazole

A une solution de 16,4 g (0,2 mole) de 3-aminocrotononitrile dans 100 cm<sup>3</sup> de n-pentanol, on a ajouté 16,7 g (0,22 mole) de  $\beta$ -hydroxyéthylhydrazine, puis on a  
5 chauffé au reflux pendant 12 heures. Le n-pentanol a ensuite été distillé sous pression réduite. On a obtenu une huile épaisse qui cristallise par ajout de 150 cm<sup>3</sup> d'éther isopropylique. On a obtenu un solide beige qui a été essoré sur verre fritté. Après séchage sous vide à 40°C, on a obtenu 18 g du produit attendu sous forme d'un solide beige dont le point de fusion était compris entre 66 et 68°C.

10

b) Préparation du 5-amino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-méthyl 4-nitroso pyrazole

A une solution de 14,1 g (0,1 mole) de 5-amino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-méthyl pyrazole, obtenu à l'étape précédente, dans 200 cm<sup>3</sup> d'éthanol absolu, on a ajouté  
15 goutte à goutte 0,5 cm<sup>3</sup> d'acide chlorhydrique 12 N, puis 13,5 cm<sup>3</sup> de nitrite d'isoamyle à 0°C. La solution a ensuite été ramenée et laissée à température ambiante pendant 4 heures. Un solide rouge a cristallisé et a été essoré sur verre fritté puis lavé par 100 cm<sup>3</sup> d'éthanol puis par 100 cm<sup>3</sup> d'éther isopropylique. Après séchage sous vide à température ambiante, on a obtenu 10,5 g du produit attendu  
20 sous la forme de cristaux rouges dont le point de fusion était compris entre 170 et 175°C.

c) Préparation du dichlorhydrate du 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-méthyl pyrazole

25

A une solution de 8,5 g (0,05 mole) du produit obtenu à l'étape précédente, dans 800 cm<sup>3</sup> de méthanol, on a ajouté 2 g de palladium sur charbon à 5 % en poids et contenant 50 % d'humidité. La suspension a été placée dans un hydrogénéateur, sous une pression de 20 bars d'hydrogène, à 30°C, pendant 4 heures sous vive  
30 agitation.

Le contenu de l'hydrogénéateur a ensuite été prélevé et filtré sur verre fritté dans 100 cm<sup>3</sup> d'une solution d'éthanol chlorhydrique 6 M. Cette solution a été concentrée sous vide. On a obtenu une huile épaisse qui a cristallisé par ajout de 50 cm<sup>3</sup> d'éther

isopropylique. On a obtenu un solide blanc qui a été recristallisé dans un mélange de 45 cm<sup>3</sup> d'éthanol chlorhydrique 6 M et 3,5 cm<sup>3</sup> d'eau distillée.

Après séchage sous vide à température ambiante, on a obtenu 7,5 g du produit attendu, sous forme de cristaux blanc dont le point de fusion était compris entre 190  
5 et 193°C. L'analyse élémentaire calculée pour C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>N<sub>4</sub>O, 2 HCl était :

	%	C	H	N	O	Cl
Calculé		31,46	6,16	24,45	6,98	30,95
Trouvé		31,44	6,21	24,10	7,07	30,98

#### EXEMPLES D'APPLICATION

10

##### EXEMPLES 9 A 17 DE TEINTURE EN MILIEU ALCALIN

On a préparé les compositions tinctoriales, conformes à l'invention, suivantes (teneurs en grammes) :



COMPOSITION	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,5-diamino 1,3-diméthyl pyrazole, dichlorhydrate	0,597	0,597	0,597	0,597					
4-amino 1,3-diméthyl 5-hydrazino pyrazole, dichlorhydrate					0,642	0,642			
4,5-diamino 3-méthyl 1-phényl pyrazole, dichlorhydrate							0,783		
4,5-diamino 3-méthyl 1-tert-butyl pyrazole, dichlorhydrate								0,724	
4,5-diamino 1-méthyl 3-tert-butyl pyrazole, dichlorhydrate									0,724
3-amino phénol	0,327				0,501				
5-N-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 2-méthyl phénol									
2,4-diamino 1- $\beta$ -hydroxyéthoxy benzène, dichlorhydrate						0,723			
2,6-dihydroxy 4-méthyl pyridine, dichlorhydrate, monohydrate		0,539							
2-méthyl 5-amino phénol								0,369	
6-hydroxy indoline, chlorhydrate			0,515						
4-hydroxy indole							0,399		
4-hydroxy N-méthyl indole				0,442					
Support de teinture commun	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Eau déminéralisée q.s.p.	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g	100 g

B	A	S	E	S
---	---	---	---	---

C	O	U	P	L	E	U	R	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(\*) support de teinture commun :

	- Alcool oléique polyglycérolé à 2 moles de glycérol	4,0	g
	- Alcool oléique polyglycérolé à 4 moles de glycérol, à 78 % de		
5	matières actives (M.A.)	5,69	g M.A.
	- Acide oléique	3,0	g
	- Amine oléique à 2 moles d'oxyde d'éthylène vendue sous la		
	dénomination commerciale ETHOMEEN O12 par la société AKZO	7,0	g
	- Laurylamino succinate de diéthylaminopropyle, sel de sodium,		
10	à 55 % de M.A.	3,0	g M.A.
	- Alcool oléique	5,0	g
	- Diéthanolamide d'acide oléique	12,0	g
	- Propylèneglycol	3,5	g
	- Alcool éthylique	7,0	g
15	- Dipropylèneglycol	0,5	g
	- Monométhyléther de propylèneglycol	9,0	g
	- Métabisulfite de sodium en solution aqueuse, à 35 % de M.A.	0,455	g M.A.
	- Acétate d'ammonium	0,8	g
	- Antioxydant, séquestrant	q.s.	
20	- Parfum, conservateur	q.s.	
	- Ammoniaque à 20 % de $\text{NH}_3$	10	g

Au moment de l'emploi, on a mélangé chaque composition tinctoriale 9 à 17 avec une quantité égale en poids d'une composition oxydante constituée par une solution  
25 d'eau oxygénée à 20 volumes (6 % en poids).

Chaque composition résultante a été appliquée pendant 30 minutes sur des mèches de cheveux gris naturels à 90 % de blancs. Les mèches de cheveux ont ensuite été rincées, lavées avec un shampoing standard puis séchées.

30

Les mèches de cheveux ont été teintées dans les nuances figurant dans le tableau ci-dessous :

EXEMPLE	pH DU MELANGE	NUANCE SUR CHEVEUX NATURELS
9	9,8	Irisé
10	9,9	Doré cuivré
11	9,9	Blond légèrement irisé
12	9,9	Violet
13	10,0	Irisé
14	9,8	Bleu violacé
15	9,8	Violine
16	9,7	Irisé
17	9,9	Bleu

#### EXEMPLES 18 ET 19 DE TEINTURE EN MILIEU ACIDE

- 5 On a préparé les compositions tinctoriales, conformes à l'invention, suivantes (teneurs en grammes) :

COMPOSITION	18	19	
4,5-diamino 1,3-diméthyl pyrazole, dichlorhydrate	0,597		B A S E S
4-amino 1,3-diméthyl 5-hydrazino pyrazole, dichlorhydrate		0,642	
2,4-diamino 1-β-hydroxyéthoxy benzène, dichlorhydrate	0,723		C O U P L
2-méthyl 5-amino phénol		0,369	
Support de teinture commun	(**)	(**)	
Eau déminéralisée q.s.p.	100 g	100 g	

(\*\*) Support de teinture commun :

	- Alcool oléique polyglycérolé à 2 moles de glycérol	4,0 g
5	- Alcool oléique polyglycérolé à 4 moles de glycérol, à 78 % de matières actives (M.A.)	5,69 g M.A.
	- Acide oléique	3,0 g
	- Amine oléique à 2 moles d'oxyde d'éthylène vendue sous la dénomination commerciale ETHOMEEN O12 par la société AKZO	7,0 g
10	- Laurylamino succinamate de diéthylaminopropyle, sel de sodium, à 55 % de M.A.	3,0 g M.A.
	- Alcool oléique	5,0 g
	- Diéthanolamide d'acide oléique	12,0 g
	- Propylèneglycol	3,5 g
15	- Alcool éthylique	7,0 g
	- Dipropylèneglycol	0,5 g
	- Monométhyléther de propylèneglycol	9,0 g
	- Métabisulfite de sodium en solution aqueuse, à 35 % de M.A.	0,455 g M.A.
	- Acétate d'ammonium	0,8 g
20	- Antioxydant, séquestrant	q.s.
	- Parfum, conservateur	q.s.
	- Monoéthanolamine q.s.p.	pH 9,8

25 Au moment de l'emploi, on a mélangé chaque composition tinctoriale avec une quantité égale en poids d'une composition oxydante constituée par une solution d'eau oxygénée à 20 volumes (6 % en poids), et dont le pH avait été ajusté entre 1 et 1,5 par 2,5 g d'acide orthophosphorique pour 100 g d'eau oxygénée.

30 Chaque composition résultante a été appliquée pendant 30 minutes sur des mèches de cheveux gris naturels à 90 % de blancs. Les mèches de cheveux ont ensuite été rincées, lavées avec un shampoing standard puis séchées.

Les mèches de cheveux ont été teintées dans les nuances figurant dans le tableau ci-dessous :

EXEMPLE	pH DU MELANGE	NUANCE SUR CHEVEUX NATURELS
18	6,9	Bleu violacé
19	6,8	Irisé

#### EXEMPLE 20 DE TEINTURE A L'AIR

5


On a préparé la composition tinctoriale, conforme à l'invention, suivante :

	- Dichlorhydrate de 4,5-diamino 1,3-diméthyl pyrazole	0,398	g
	- Dichlorhydrate de 2,4-diamino 1-β-hydroxyéthoxy benzène	0,482	g
10	- Alcool éthylique	10	g
	- Monoéthanolamine	2	g
	- Eau déminéralisée q.s.p.	100	g

15 Cette composition a été appliquée pendant 30 minutes sur des mèches de cheveux gris naturels à 90 % de blancs. Après rinçage et séchage, les mèches ont été teintées dans une nuance cendrée violacée.


## REVENDECATIONS

1. Composition pour la teinture d'oxydation des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins un 4,5-diamino pyrazole 3-substitué de formule (I) suivante à titre de base d'oxydation et/ou au moins un de ses sels d'addition avec un acide :



10 dans laquelle :

- R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> et R<sub>5</sub>, identiques ou différents, représentent un atome d'hydrogène ; un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> linéaire ou ramifié ; un radical hydroxyalkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> ; un radical aminoalkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> ; un radical phényle ; un radical phényle substitué par un atome d'halogène ou un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, nitro, trifluorométhyle, amino ou alkylamino en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> ; un radical benzyle ; un radical benzyle substitué par un atome d'halogène ou par un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, méthylènedioxy ou amino ; ou un radical



20


dans lequel m et n sont des nombres entiers, identiques ou différents, compris entre 1 et 3 inclusivement, X représente un atome d'oxygène ou bien le groupement NH, Y représente un atome d'hydrogène ou bien un radical méthyle, et Z représente un radical méthyle, un groupement OR ou NRR' dans lesquels R et R', qui peuvent être identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, un radical méthyle ou un radical éthyle, étant entendu que lorsque R<sub>2</sub> représente un atome d'hydrogène, alors R<sub>3</sub> peut également représenter un radical amino ou alkylamino en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>,

25

- $R_6$  représente un radical alkyle en  $C_1-C_6$ , linéaire ou ramifié ; un radical hydroxyalkyle en  $C_1-C_4$  ; un radical aminoalkyle en  $C_1-C_4$  ; un radical phényle ; un radical phényle substitué par un atome d'halogène ou par un radical alkyle en  $C_1-C_4$ , alcoxy en  $C_1-C_4$ , nitro, trifluorométhyle, amino ou alkylamino en  $C_1-C_4$  ; un radical benzyle ; un radical benzyle substitué par un atome d'halogène ou par un radical alkyle en  $C_1-C_4$ , alcoxy en  $C_1-C_4$ , nitro, trifluorométhyle, amino ou alkylamino en  $C_1-C_4$  ; un hétérocycle choisi parmi le thiophène, le furane et la pyridine, ou encore un radical  $-(CH_2)_p-O-(CH_2)_q-OR''$ , dans lequel p et q sont des nombres entiers, identiques ou différents, compris entre 1 et 3 inclusivement et  $R''$  représente un atome d'hydrogène ou un radical méthyle,

étant entendu que dans la formule (I) ci-dessus :

- au moins un des radicaux  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$  et  $R_5$  représente un atome d'hydrogène,
- lorsque que  $R_2$ , respectivement  $R_4$ , représente un radical phényle substitué ou non, ou un radical benzyle ou un radical



- alors  $R_3$ , respectivement  $R_5$ , ne peut représenter aucun de ces trois radicaux,
- lorsque  $R_4$  et  $R_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors  $R_1$  peut former, avec  $R_2$  et  $R_3$ , un hétérocycle hexahydropyrimidinique ou tétrahydroimidazolique éventuellement substitué par un radical alkyle en  $C_1-C_4$  ou 1,2,4-tétrazolique,
- lorsque  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$  et  $R_5$  représentent un atome d'hydrogène ou un radical alkyle en  $C_1-C_6$ , alors  $R_1$  ou  $R_6$  peut également représenter un reste hétérocyclique 2, 3 ou 4-pyridyle, 2 ou 3-thiényle, 2 ou 3-furyle éventuellement substitué par un radical méthyle ou bien encore un radical cyclohexyle.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués de formule (I) sont choisis parmi :

- le 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-(4'-méthylphényl) pyrazole,

- le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-(3'-méthylphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-(4'-méthoxyphényl) 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole,
- 5 - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-hydroxyméthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-ter-butyl pyrazole,
- 10 - le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-phényl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-(2'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-(3'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 1-benzyl 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl pyrazole,
- 15 - le 4,5-diamino 3-méthyl 1-(2'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-(3'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-méthyl pyrazole,
- le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-éthyl pyrazole,
- 20 - le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-isopropyl pyrazole,
- le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-éthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-isopropyl pyrazole,
- 25 - le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-éthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-ter-butyl pyrazole,
- 30 - le 4,5-diamino 3-méthylaminométhyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthylaminométhyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthylaminométhyl pyrazole,
- le 1-ter-butyl 4,5-diamino 3-méthylaminométhyl pyrazole,



- le 4,5-diamino 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] pyrazole,
- le 1-ter-butyl 4,5-diamino 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] pyrazole,
- 5 - le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1,3-diméthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-isopropyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-ter-butyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-phényl 3-méthyl pyrazole,
- 10 - le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-(2-méthoxyphényl) 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-(3-méthoxyphényl) 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-(4-méthoxyphényl) 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-benzyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 1-éthyl 3-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- 15 - le 4-amino 1-ter-butyl 3-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- le 4,5-diamino 1,3-diméthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-tert-butyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-tert-butyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-méthyl 3-phényl pyrazole,
- 20 - le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-phényl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-méthyl 3-(2'-chlorophényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-méthyl 3-(4'-chlorophényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-méthyl 3-(3'-trifluorométhylphényl) pyrazole,
- 25 - le 4,5-diamino 1,3-diphényl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-phényl pyrazole,
- le 4-amino 1,3-diméthyl 5-phénylamino pyrazole,
- le 4-amino 1-éthyl 3-méthyl 5-phénylamino pyrazole,
- le 4-amino 1,3-diméthyl 5-méthylamino pyrazole,
- 30 - le 4-amino 3-méthyl 1-isopropyl 5-méthylamino pyrazole,
- le 4-amino 3-isobutoxyméthyl 1-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- le 4-amino 3-méthoxyéthoxyméthyl 1-méthyl 5-méthylamino pyrazole,

- le 4-amino 3-hydroxyméthyl 1-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
  - le 4-amino 1,3-diphényl 5-phénylamino pyrazole,
  - le 4-amino 3-méthyl 5-méthylamino 1-phényl pyrazole,
  - le 4-amino 1,3-diméthyl 5-hydrazino pyrazole,
  - 5 - le 5-amino 3-méthyl 4-méthylamino 1-phényl pyrazole,
  - le 5-amino 1-méthyl 4-(N,N-méthylphényl)amino 3-(4'-chlorophényl) pyrazole,
  - le 5-amino 3-éthyl 1-méthyl 4-(N,N-méthylphényl)amino pyrazole,
  - le 5-amino 1-méthyl 4-(N,N-méthylphényl)amino 3-phényl pyrazole,
  - le 5-amino 3-éthyl 4-(N,N-méthylphényl)amino pyrazole,
  - 10 - le 5-amino 4-(N,N-méthylphényl)amino 3-phényl pyrazole,
  - le 5-amino 4-(N,N-méthylphényl)amino 3-(4'-méthylphényl) pyrazole,
  - le 5-amino 3-(4'-chlorophényl) 4-(N,N-méthylphényl)amino pyrazole,
  - le 5-amino 3-(4'-méthoxyphényl) 4-(N,N-méthylphényl)amino pyrazole,
  - le 4-amino 5-méthylamino 3-phényl pyrazole,
  - 15 - le 4-amino 5-éthylamino 3-phényl pyrazole,
  - le 4-amino 5-éthylamino 3-(4'-méthylphényl) pyrazole,
  - le 4-amino 3-phényl 5-propylamino pyrazole,
  - le 4-amino 5-butylamino 3-phényl pyrazole,
  - le 4-amino 3-phényl 5-phénylamino pyrazole,
  - 20 - le 4-amino 5-benzylamino 3-phényl pyrazole,
  - le 4-amino 5-(4'-chlorophényl)amino 3-phényl pyrazole,
  - le 4-amino 3-(4'-chlorophényl) 5-phénylamino pyrazole,
  - le 4-amino 3-(4'-méthoxyphényl) 5-phénylamino pyrazole,
  - le 1-(4'-chlorobenzyl) 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole,
  - 25 - le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole,
  - le 4-amino 1-éthyl 3-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- et leurs sels d'addition avec un acide.


3. Composition selon la revendication 2, caractérisée par le fait que les 4,5-diamino  
 30 pyrazoles 3-substitués de formule (I) sont choisis parmi :

- le 4,5-diamino 1,3-diméthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-phényl pyrazole,

- le 4,5-diamino 1-méthyl 3-phényl pyrazole,
  - le 4-amino 1,3-diméthyl 5-hydrazino pyrazole,
  - le 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 3-tert-butyl 1-méthyl pyrazole,
  - 5 - le 4,5-diamino 1-tert-butyl 3-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
  - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-hydroxyméthyl pyrazole,
  - 10 - le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-méthyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole,
  - le 4,5-diamino 3-méthyl 1-isopropyl pyrazole,
- et leurs sels d'addition avec un acide.
- 15 4. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le ou les 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués de formule (I) représentent de 0,0005 à 12 % en poids du poids total de la composition tinctoriale.
- 20 5. Composition selon la revendication 4, caractérisée par le fait que le ou les 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués de formule (I) représentent de 0,005 à 6 % en poids du poids total de la composition tinctoriale.
- 25 6. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le milieu approprié pour la teinture (ou support) est constitué par de l'eau ou par un mélange d'eau et d'au moins un solvant organique choisi parmi les alcanols inférieurs en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, le glycérol, les glycols et éthers de glycols, les alcools aromatiques, les produits analogues et leurs mélanges.
- 30 7. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle présente un pH compris entre 3 et 12.

8. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle renferme au moins une base d'oxydation additionnelle choisie parmi les paraphénylènediamines, les bis-phénylalkylènediamines, les para-aminophénols, les ortho-aminophénols et  
5 des bases hétérocycliques différentes des 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués de formule (I).
9. Composition selon la revendication 8, caractérisée par le fait que la ou les bases d'oxydation additionnelles représentent de 0,0005 à 12 % en poids du poids total  
10 de la composition tinctoriale.
10. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait qu'elle renferme au moins un coupleur et/ou au moins un colorant direct.  
15
11. Composition selon la revendication 10, caractérisée par le fait que le ou les coupleurs sont choisis parmi les métaphénylènediamines, les méta-aminophénols, les métadiphénols et les coupleurs hétérocycliques, et leurs sels d'addition avec un acide.  
20
12. Composition selon la revendication 10 ou 11, caractérisée par le fait que le ou les coupleurs représentent de 0,0001 à 10 % en poids du poids total de la composition tinctoriale.
- 25 13. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que les sels d'addition avec un acide sont choisis parmi les chlorhydrates, les bromhydrates, les sulfates et les tartrates, les lactates et les acétates.
- 30 14. Procédé de teinture des fibres kératiniques et en particulier des fibres kératiniques humaines telles que les cheveux caractérisé par le fait que l'on applique sur ces fibres au moins une composition tinctoriale telle que définie à l'une quelconque des revendications 1 à 13, pendant un temps suffisant pour développer la coloration désirée, soit à l'air, soit à l'aide d'un agent oxydant.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé par le fait que la coloration est révélée au seul contact de l'oxygène de l'air.
- 5 16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé par le fait que la coloration est révélée au seul contact de l'oxygène de l'air, en présence de catalyseurs d'oxydation.
- 10 17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé par le fait que les catalyseurs d'oxydation sont des sels métalliques.
- 15 18. Procédé selon la revendication 14, caractérisé par le fait que l'on révèle la couleur à pH acide, neutre ou alcalin à l'aide d'un agent oxydant qui est ajouté juste au moment de l'emploi à la composition tinctoriale ou qui est présent dans une composition oxydante appliquée simultanément ou séquentiellement de façon séparée.
- 20 19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé par le fait que l'agent oxydant est choisi parmi le peroxyde d'hydrogène, le peroxyde d'urée, les bromates de métaux alcalins, les persels tels que les perborates et persulfates.
- 25 20. Dispositif à plusieurs compartiments, ou "kit" de teinture à plusieurs compartiments, dont un premier compartiment renferme une composition tinctoriale telle que définie à l'une quelconque des revendications 1 à 13 et un second compartiment renferme une composition oxydante.
21. Nouveaux 4,5-diamino pyrazoles 3-substitués et leurs sels d'addition avec un acide, ayant pour formule :



dans laquelle  $R'_1$ ,  $R'_2$ ,  $R'_3$ ,  $R'_4$ ,  $R'_5$  et  $R'_6$  ont les mêmes significations que celles indiquées précédemment pour les radicaux  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_5$  et  $R_6$  dans la formule (I), avec les réserves suivantes :

(i) lorsque  $R'_1$  représente un radical méthyle, et que  $R'_2$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène et que  $R'_3$  représente un atome d'hydrogène ou un radical méthyle, alors  $R'_6$  est différent d'un radical hydroxyméthyle, isobutyloxy-méthyle, méthoxyéthoxy-méthyle, cyclohexyle, thiophène, pyridine, phényle ou phényle substitué par un radical méthyle ou par un radical trifluorométhyle ou par un atome de chlore ;

(ii) lorsque  $R'_1$  représente un radical phényle non substitué, et que  $R'_2$ ,  $R'_3$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors  $R'_6$  est différent d'un radical phényle non substitué ;

(iii) lorsque  $R'_1$  représente un radical phényle non substitué, et que  $R'_6$  représente un radical méthyle et que  $R'_2$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors  $R'_3$  est différent d'un atome d'hydrogène, d'un radical méthyle ou phényle non substitué ;

(iv) lorsque  $R'_1$  représente un radical phényle non substitué, et que  $R'_6$  représente un radical méthyle et que  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène et que  $R'_2$  représente un radical méthyle ou éthyle, alors  $R'_3$  est différent d'un radical phényle non substitué ;

(v) lorsque  $R'_1$  représente un radical phényle non substitué, et que  $R'_6$  représente un radical méthyle et que  $R'_2$ ,  $R'_3$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors  $R'_4$  est différent d'un radical méthyle ;

(vi) lorsque  $R'_2$ ,  $R'_3$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, et que  $R'_6$  représente un radical méthyle, alors  $R'_1$  est différent d'un radical phényle substitué par un atome de chlore, par un radical trifluoroéthyle, nitro ou pyridyle ;

(vii) lorsque  $R'_1$  représente un atome d'hydrogène, et que  $R'_6$  représente un radical phényle ou un radical phényle substitué par un atome de chlore, par un radical méthyle ou méthoxy et que  $R'_2$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors  $R'_3$  est différent d'un atome d'hydrogène, d'un radical alkyle en  $C_1$ - $C_4$  ou phényle non substitué ;

(viii) lorsque  $R'_1$ ,  $R'_2$ ,  $R'_3$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors  $R'_6$  est différent d'un radical méthyle ;

(ix) lorsque  $R'_1$  représente un radical  $\beta$ -hydroxyéthyle, et que  $R'_2$ ,  $R'_3$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors  $R'_6$  est différent d'un radical méthyle ou phényle non substitué ;

(x) lorsque  $R'_4$  représente un radical méthyle, et que  $R'_5$  représente un radical phényle non substitué et que  $R'_2$  et  $R'_3$  représentent simultanément un atome d'hydrogène et que  $R'_1$  représente un atome d'hydrogène ou un radical méthyle, alors  $R'_6$  est différent d'un radical phényle non substitué ou d'un radical phényle substitué par un radical méthyle, éthyle, méthoxy ou par un atome de chlore ;

(xi) lorsque  $R'_1$  représente un radical ter-butyle, et que  $R'_2$ ,  $R'_3$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors  $R'_6$  est différent d'un radical méthyle ;

(xii) lorsque  $R'_1$  représente un radical pyridyle, et que  $R'_2$ ,  $R'_4$  et  $R'_5$  représentent simultanément un atome d'hydrogène et que  $R'_3$  représente un atome d'hydrogène ou un radical méthyle, alors  $R'_6$  est différent d'un radical méthyle ou phényle non substitué ;

(xiii) lorsque R<sub>1</sub> représente un radical méthyle, éthyle ou 4-aminophényle, et que R<sub>2</sub>, R<sub>4</sub> et R<sub>5</sub> représentent simultanément un atome d'hydrogène et que R<sub>3</sub> représente un atome d'hydrogène ou un radical phényle non substitué alors R<sub>6</sub> est différent d'un radical méthyle ;

(xiv) lorsque R<sub>1</sub> représente un radical isopropyle, et que R<sub>2</sub>, R<sub>4</sub> et R<sub>5</sub> représentent simultanément un atome d'hydrogène, alors au moins un des radicaux R<sub>3</sub> et R<sub>6</sub> est différent d'un radical méthyle ;

(xv) lorsque R<sub>1</sub> représente un atome d'hydrogène ou un radical phényle non substitué, et que R<sub>2</sub>, R<sub>4</sub> et R<sub>5</sub> représentent simultanément un atome d'hydrogène et que R<sub>3</sub> représente un radical benzyle ou un radical phényle substitué par un radical méthyle ou par un atome de chlore, alors R<sub>6</sub> est différent d'un radical méthyle ou phényle non substitué.

22. Composés selon la revendication 21, caractérisés par le fait qu'ils sont choisis parmi :

- le 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-(4'-méthoxyphényle) pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-(4'-méthylphényle) pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-( $\beta$ -hydroxyéthyl) 3-(3'-méthylphényle) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-(4'-méthoxyphényle) 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-(4'-méthoxyphényle) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-hydroxyméthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-phényle pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-(2'-méthoxyphényle) pyrazole,



- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-(3'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 1-benzyl 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-(2'-méthoxyphényl) pyrazole,
- 5 - le 4,5-diamino 3-méthyl 1-(3'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthyl 1-(4'-méthoxyphényl) pyrazole,
- le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-méthyl pyrazole,
- le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-éthyl pyrazole,
- le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-isopropyl pyrazole,
- 10 - le 3-aminométhyl 4,5-diamino 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-éthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-diméthylaminométhyl 1-ter-butyl pyrazole,
- 15 - le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-éthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-éthylaminométhyl 1-ter-butyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-méthylaminométhyl 1-méthyl pyrazole,
- 20 - le 4,5-diamino 3-méthylaminométhyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthylaminométhyl pyrazole,
- le 1-ter-butyl 4,5-diamino 3-méthylaminométhyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] 1-isopropyl pyrazole,
- 25 - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] pyrazole,
- le 1-ter-butyl 4,5-diamino 3-[( $\beta$ -hydroxyéthyl)aminométhyl] pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1,3-diméthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-isopropyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole,
- 30 - le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-ter-butyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-phényl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-(2'-méthoxyphényl) 3-méthyl pyrazole,

- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-(3'-méthoxyphényl) 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-(4'-méthoxyphényl) 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 5-( $\beta$ -hydroxyéthyl)amino 1-benzyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4-amino 1-éthyl 3-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- 5 - le 4-amino 1-ter-butyl 3-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- le 1-(4'-chlorobenzyl) 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole,
- le 4-amino 1-éthyl 3-méthyl 5-méthylamino pyrazole,
- et leurs sels d'addition avec un acide.

10

23. Composés selon la revendication 22, caractérisés par le fait qu'ils sont choisis parmi :

- le 1-benzyl 4,5-diamino 3-méthyl pyrazole,
- 15 - le 4,5-diamino 1-éthyl 3-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-(4'-méthoxyphényl) pyrazole
- le 4,5-diamino 1-éthyl 3-hydroxyméthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-méthyl pyrazole,
- le 4,5-diamino 3-hydroxyméthyl 1-isopropyl pyrazole,
- 20 - le 4,5-diamino 3-méthyl 1-isopropyl pyrazole,
- et leurs sels d'addition avec un acide.

24. Procédé de préparation d'un composé de formule (I') selon l'une quelconque des revendications 21 à 23, dans lequel R<sub>6</sub> représente un radical méthyle et R<sub>1</sub> est différent d'un atome d'hydrogène, caractérisé par le fait qu'il consiste à faire  
25 réagir, dans une première étape, un 3-aminocrotononitrile avec une hydrazine monosubstituée, à une température supérieure à 90°C dans un solvant alcoolique puis, dans une deuxième étape, à nitroser le 5-aminopyrazole en position 4, par réaction avec un nitrite minéral ou organique pour donner un 5-amino  
30 4-nitrosopyrazole, qui conduit, dans une troisième étape, par hydrogénation catalytique aux 4,5-diamino pyrazoles de formule (I') dans lesquels R<sub>6</sub> représente un radical méthyle et R<sub>1</sub> est différent d'un atome d'hydrogène.

25. Procédé de préparation d'un composé de formule (I') selon l'une quelconque des revendications 21 à 23, dans lequel  $R'_6$  est différent d'un radical méthyle et  $R'_1$  est différent d'un atome d'hydrogène, caractérisé par le fait qu'il consiste à faire réagir, dans une première étape, un  $\beta$ -cétoacétonitrile avec une hydrazine monosubstituée, à une température comprise entre 20 et 150°C, dans un solvant alcoolique, pour obtenir un 5-aminopyrazole qui est ensuite nitrosé en position 4, dans une deuxième étape, pour donner un 4-nitro 5-amino pyrazole qui est ensuite lui-même hydrogéné, dans une troisième étape, pour conduire aux 4,5-diamino pyrazoles de formule (I') dans lesquels  $R'_6$  est différent d'un radical méthyle et  $R'_1$  est différent d'un atome d'hydrogène.
26. Procédé de préparation d'un composé de formule (I') selon l'une quelconque des revendications 21 à 23, dans lequel  $R'_6$  représente un radical à fort encombrement stérique, caractérisé par le fait qu'il consiste à faire réagir, dans une première étape, un  $\beta$ -cétoacétonitrile avec une hydrazine monosubstituée pour obtenir un 5-aminopyrazole qui est ensuite acétylé en position 5, dans une deuxième étape, pour conduire à un 5-acétylamino pyrazole qui est lui-même ensuite nitré en position 4 et désacétylé en position 5, dans une troisième étape, pour donner un 5-amino 4-nitro pyrazole qui est ensuite hydrogéné, dans une quatrième étape, pour conduire aux 4,5-diamino pyrazoles de formule (I') dans lesquels  $R'_6$  représente un radical à fort encombrement stérique.
27. Procédé de préparation d'un composé de formule (I') selon l'une quelconque des revendications 21 à 23, dans lequel un des radicaux  $R'_2$  ou  $R'_3$  est différent d'un atome d'hydrogène, caractérisé par le fait qu'il consiste à faire réagir, dans une première étape, un  $\beta$ -cétoester avec une hydrazine, pour obtenir un 5-hydroxypyrazole en équilibre avec sa forme tautomère pyrazol-5-one, qui est ensuite nitré en position 4, dans une deuxième étape, puis chloré en position 5, dans une troisième étape, pour obtenir un 5-chloro 4-nitro pyrazole, qui conduit ensuite, dans une quatrième étape, en présence d'une amine primaire  $H_2N-R'_3$  à un 5-amino 4-nitro pyrazole, puis dans une cinquième étape, par hydrogénation catalytique, aux 4,5-diamino pyrazoles de formule (I') dans lesquels un des radicaux  $R'_2$  ou  $R'_3$  est différent d'un atome d'hydrogène.

INSTITUT NATIONAL  
de la  
PROPRIETE INDUSTRIELLERAPPORT DE RECHERCHE  
PRELIMINAIREétabli sur la base des dernières revendications  
déposées avant le commencement de la rechercheFA 513310  
FR 9505422

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A,D	EP-A-0 375 977 (WELLA AKTIENGESELLSCHAFT) * le document en entier * ---	1,21
A	WO-A-94 08970 (WELLA AKTIENGESELLSCHAFT) * le document en entier * ---	1,21
A	WO-A-94 08971 (WELLA AKTIENGESELLSCHAFT) * le document en entier * ---	1,21
A	WO-A-94 08969 (WELLA AKTIENGESELLSCHAFT) * le document en entier * ---	1,21
A	EP-A-0 216 334 (HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT) * le document en entier * ---	1,20
A	GB-A-2 180 215 (L'ORÉAL) * le document en entier * ---	20
D	& FR-A-2 586 913 -----	
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (let. CL 6)
		A61K C07D B65D
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
24 Janvier 1996		Kyriakakou, G
<p><b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b></p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul  Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un  autre document de la même catégorie  A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication  ou arrière-plan technologique général  O : divulgation non-écrite  P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention  E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure  à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date  de dépôt ou qu'à une date postérieure.  D : cité dans la demande.  L : cité pour d'autres raisons  &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>		